Namensreaktionen und Schlagwörter in der organischen Synthese

(zusammengestellt von Jörg Fritscher)

Vorwort

Dieses Skript beinhaltet – in alphabetischer Reihenfolge – eine (subjektive) Auswahl an Reaktionen und Begriffen, die in der organischen Synthese von Bedeutung sind. Dabei wurde auch auf moderne Methoden Wert gelegt.

Das Skript soll als Orientierungshilfe für das Hauptstudium dienen und kein organisch-chemisches Lehrbuch ersetzen. Ergänzend zur vorhandenen Literatur soll es einen Überblick darüber geben, von welchen Reaktionen und Begriffen man schon einmal etwas gehört haben sollte bzw. mit welchen man sich eventuell näher befassen könnte (daneben finden sich auch einige exotischere Reaktionen in diesem Skript). In diesem Sinne könnte es auch zur schnellen Rekapitulation von Gelerntem oder als kurzes Nachschlagewerk verwendet werden.

Die angesprochenen Namens- und Schlagwortreaktionen werden kurz beschrieben und es wird hier und da auf eventuell vorhandene Selektivitäten hingewiesen. Weiterhin findet man zu jeder Reaktion mindestens ein Beispiel, aus dem man etwas über die konkrete Anwendung der jeweiligen Methode (Reaktionsbedingungen, Selektivität etc.) lernen kann. In der Regel wird aber weder der Reaktionsmechanismus erläutert noch werden die Gründe bzw. Modelle zur Erklärung der Selektivitäten aufgeführt. Weiterhin findet man zahlreiche – oft mit den Namen der verantwortlichen Wissenschaftler behaftete – Begriffe und Regeln, die auch jeweils kurz erläutert werden. Am Ende des Skripts finden sich eine Übersicht über gängige Schutzgruppen, ein PSE sowie einige Literaturhinweise.

Das Skript erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beinhaltet sicherlich noch den einen oder anderen Fehler – an deren Beseitigung kann aber gearbeitet werden! (Reaktionen, die mit (???) gekennzeichnet sind, sind mit Vorsicht zu genießen: Über sie habe ich entweder keine weiteren Informationen gefunden oder es bestehen Unklarheiten irgendwelcher Art etc.)

Dank gebührt Andreas Krebs für das Korrekturlesen der Rohfassung und einige wichtige Kommentare und Ergänzungen.

Jörg Fritscher, August 2002

Inhalt

1. *Acyloin-Kondensation*
2. *Aldolreaktion*
3. *Alkenmetathese*
4. *Alpha-Effekt*
5. *Anomerer Effekt*
6. *Appel-Reaktion*
7. *Arbusov-Reaktion*
8. *Arndt-Eistert-Synthese*
9. *Azokupplung*
10. *Baeyer-Villiger-Oxidation*
11. *Baldwin-Regeln*
12. *Bamford-Stevens-Reaktion*
13. *Barbier-Reaktion*
14. *Barton-McCombie-Desoxygenierung*
15. *Barton-Reaktion*
16. *Baylis-Hillman-Reaktion*
17. *Beckmann-Umlagerung*
18. *Benzilsäure-Umlagerung*
19. *Benzoin-Kondensation*
20. *Bergman-Cyclisierung*
21. *Beta-(Silyl-)Effekt*
22. *Birch-Reduktion*
23. *Bischler-Napieralski-Isochinolin-Synthese*
24. *Blanc-Reaktion*
25. *Bouveault-Blanc-Reduktion*
26. *Bredt'sche Regel*
27. *Brook-Umlagerung*
28. *Brown-Reagenz*
29. *Bucherer-Reaktion*
30. *Bürgi-Dunitz-Prinzip*
31. *Cadiot-Chodkiewicz-Verfahren*
32. *Cannizzaro-Reaktion*
33. *CBS-Reduktion (Corey-Bakshi-Shibata-Reduktion)*
34. *Chan-Umlagerung*
35. *Chichibabin-Reaktion*
36. *Chugaev-Reaktion*
37. *Claisen-Kondensation*
38. *Claisen-Umlagerung*
39. *Claisen-Umlagerung (Eschenmoser-Variante)*
40. *Claisen-Umlagerung (Johnson-Variante)*
41. *Claisen-Umlagerung (Carroll-Variante)*
42. *Claisen-Umlagerung (Arnold-Variante)*
43. *Claisen-Umlagerung (Ireland-Variante)*
44. *Clemmensen-Reduktion*
45. *Cohen-Verfahren*
46. *Collins-Oxidation*
47. *Collman-Reagenz*
48. *Cope-Eliminierung*
49. *oxy-Cope-Umlagerung*
50. *Corey-Fuchs-Verfahren*
51. *Corey-Kwiatkowski-Reaktion*
52. *Corey-Winter-Reaktion*
53. *Cram-/Cram-Chelat-Modell*
54. *Curtius-Umlagerung*
55. *1,3-Dipolare Cycloaddition*
56. *[2+2]Cycloaddition*
57. *Danishesky-Dien*
58. *Darzens-Kondensation*
59. *DDQ*
60. *Dehydratisierung von Alkoholen*
61. *Delépine-Reaktion*

62. *Demjanov-Umlagerung*
63. *Dess-Martin-Oxidation*
64. *Diazotierung*
65. *Dieckmann-Kondensation*
66. *Diels-Alder-Reaktion*
67. *Di- π -Methan-Umlagerung*
68. *Dötz-Reaktion*
69. *Edman-Abbau*
70. *Enderssches RAMP/SAMP-Verfahren*
71. *En-Reaktion*
72. *Erlenmeyer-Regel*
73. *Eschenmoser-Tanabe-Fragmentierung*
74. *Esterpyrolyse*
75. *Evans-Aldol-Reaktion*
76. *Evans-Synthese α -chiraler Carbonsäuren*
77. *Favorskii-Umlagerung*
78. *Felkin-Anh-Modell*
79. *Fétizon-Reagenz*
80. *carbon-Ferrier-Umlagerung*
81. *Finkelstein-Reaktion*
82. *Fischer-Indol-Reaktion*
83. *Fischer-Veresterung*
84. *Fleming-Tamao-Oxidation*
85. *Friedel-Crafts-Acylierung*
86. *Friedel-Crafts-Alkylierung*
87. *Friedländer-Chinolinsynthese*
88. *Fries-Umlagerung*
89. *Fritsch-Buttenberg-Wiechell-Umlagerung*
90. *Gabriel-Synthese*
91. *Garner-Aldehyd*
92. *Gattermann-Synthese*
93. *Gattermann-Koch-Synthese*
94. *Gilman-Cuprate*
95. *Glaser-Reaktion (Eglinton-Kupplung)*
96. *Glycolspaltung*
97. *Gomberg-Bachmann-Reaktion*
98. *Grignard-Reaktion*
99. *Grob-Fragmentierung*
100. *Haller-Bauer-Reaktion*
101. *Haloform-Reaktion*
102. *Hammond-Postulat*
103. *Heck-Reaktion*
104. *Hell-Volhard-Zelinskii-Reaktion*
105. *Hendrickson-McMurry-Reagenz*
106. *Henry-Reaktion*
107. *Hofmann-Eliminierung*
108. *Hofmann-Umlagerung*
109. *Horner-Wadsworth-Emmons-Olefinierung*
110. *Horner-Wadsworth-Emmons-Olefinierung (Still-Gennari-Variante)*
111. *Hückel-Regel*
112. *Hünig-Base*
113. *Hunsdiecker-Reaktion*
114. *Hydroborierung*
115. *Hydroperoxid-Umlagerung*
116. *Iodlactonisierung*
117. *Jacobsen-Epoxidierung*
118. *Jones-Oxidation*
119. *Julia-Epoxidierung*
120. *Julia-(Lythgoe-)Olefinierung*
121. *Keck-Allylierung*
122. *Knoevenagel-Kondensation*
123. *Kolbe-Nitril-Synthese*
124. *Kolbe-Schmitt-Reaktion*
125. *Krapcho-Decarboxylierung*
126. *Kulinkovich-Reaktion*
127. *Lemieux-Johnson- u. Lemieux-von Rudloff-Ox.*

128. *Leuckart-Wallach-Reaktion*
129. *Lindlar-Katalysator*
130. *Lossen-Umlagerung*
131. *Luche-Reduktion*
132. *Majetich-Cyclobutan-Anellierung*
133. *Malonester-Synthese*
134. *Mannich-Reaktion*
135. *Matteson-Reaktion*
136. *McMurry-Kupplung*
137. *Meerwein-Ponndorf-Verley-Reaktion*
138. *Meerwein-Salze*
139. *Michael-Addition*
140. *Mitsunobu-Reaktion*
141. *Mosher's Acid*
142. *Mukaiyama-Aldolreaktion*
143. *Mukaiyama-Redoxkondensation*
144. *Nazarov-Cyclisierung*
145. *Neber-Reaktion*
146. *Nef-Reaktion*
147. *Nozaki-(Takai-)Hiyama-(Kichi-)Reaktion*
148. *Noyori-Hydrierung*
149. *Nysted-Reagenz*
150. *Oxidationen von Alkoholen und Aldehyden*
151. *Oxidationen von aktivierten C-H-Bindungen etc.*
152. *Ozonolyse*
153. *Parikh-Doering-Oxidation*
154. *Paterno-Büchi-Cyclisierung*
155. *Pauson-Khand-Reaktion*
156. *Payne-Umlagerung*
157. *Pearlman-Katalysator*
158. *Pechmann-Kondensation*
159. *Perkin-Reaktion*
160. *Peterson-Olefinierung*
161. *Pictet-Spengler-Cyclisierung*
162. *Pinakol-Kupplung*
163. *Pinakol-Umlagerung*
164. *Prilezhaev-Reaktion*
165. *Prins-Reaktion*
166. *Reppe-Chemie*
167. *Ramberg-Bäcklund-Uml.*
168. *Raney-Nickel*
169. *Reduktionen*
170. *Reformatsky-Reaktion*
171. *Robinson-Anellierung*
172. *Rosenmund-Reduktion*
173. *Roush-Kupplung*
174. *Sakurai-Reaktion*
175. *Sandmeyer-Reaktion*
176. *Schiemann-Reaktion*
177. *Schiff-Base*
178. *Schmidt-Reaktion*
179. *Schwartz-Reagenz*
180. *Screttas-Yus-Verfahren*
181. *Selenoxidpyrolyse*
182. *Seyferth-Gilbert-Homologisierung (Seyferth-Verfahren)*
183. *Shapiro-Reaktion*
184. *Sharpless-Asymmetrische-Dihydroxylierung*
185. *Sharpless-Epoxidierung*
186. *Simmons-Smith-Reaktion*
187. *Skraup-Chinolinsynthese*
188. *Sonogashira-Kupplung*
189. *Steglich-Base*
190. *Stephens-Castro-Kupplung*
191. *Stevens-Umlagerung*
192. *Stille-Kupplung*
193. *Stobbe-Kondensation*
194. *Stork-Enamin-Reaktion*
195. *Strecker-Synthese*
196. *Suzuki-Kupplung*

197. *Swern-Oxidation*
198. *Takai-Reaktion*
199. *Tebbe-Reagenz*
200. *Tiffeneau-Demjanov-Uml.*
201. *Tishchenko-Reaktion*
202. *Ugi-Kondensation*
203. *Ullmann-Reaktion*
204. *Umlagerungen*
205. *Veresterung / Aktivierung /
Makrolactonisierung nach
Mukaiyama, Yamaguchi
und Corey-Nicolau*
206. *Vilsmeier-Formylierung
(Vilsmeier-Haack)*
207. *Vinylcyclopropan-Umlagerung*
208. *Wacker-Verfahren*
209. *Wagner-Meerwein-Uml.*
210. *Weinreb-Amide*
211. *Weinreb-Reagenz*
212. *Wilkinson-Katalysator*
213. *Willgerodt-Kindler-Reaktion*
214. *Williamson-Ethersynthese*
215. *Wittig-Horner-Reaktion*
216. *Wittig-Olefinierung*
217. *Wittig-Olefinierung (Schlosser-
Variante)*
218. *Wittig-Umlagerung*
219. *Wohl-Ziegler-Bromierung*
220. *Wolff-Umlagerung*
221. *Wolff-Kishner-Reduktion*
222. *Wolff-Kishner-Reduktion
(Huang-Minlon-Variante)*
223. *Woodward-Hoffmann-Regeln*
224. *Wurtz-Reaktion*
225. *Zimmerman-Traxler-Übergangs-
zustands-Modell*
226. *Schutzgruppen*
227. *PSE*
228. *Literatur*

Acyloin-Kondensation

(α -Hydroxyketone aus Carbonsäureestern mit Na in Xylol)

Aldolreaktion

(Reaktion zweier Carbonylverbindungen (Enolat und Carbonylverb.) zu β -Hydroxycarbonylverbindungen, evtl. Kondensation ($E1_{cb}$); E -Enolat $\rightarrow$ anti, Z -Enolat $\rightarrow$ syn; auch Nitroaldolreakt. möglich (Henry-R.))

Alkenmetathese

(Umlagerung von Olefinen unter Metallkatalyse, z.B. Mo-Schrock-Carben-Komplexe, Grubbs-Kat. (Ru-Carben-Kompl.), Tebbe-Reagenz)

Alpha-Effekt

(Erhöhung der Nucleophilie eines Nucleophils, wenn sich in Nachbarposition zum angreifenden Atom ein Atom mit freiem Elektronenpaar befindet)

z.B.: $\text{Me}_2\text{C}=\text{NO}^-$ oder NH_2NH_2 oder HO_2^-

Anomerer Effekt

(stereoelektronischer Effekt, der z.B. eine polare Gruppe (Heteroatom) an einem C-Atom in α -Position zu einem Heteroatom (m. freiem Elektronenpaar) eines Heterosechtrings in axialer Position stabilisiert; von besonderer Bedeutung in der Zuckerchemie)

z.B. größere Stabilität von α -Glykosiden gegenüber β -Glykosiden

Stabilisierung des einen freien Elektronenpaares durch Überlapp mit einem antibindenden Orbital zwischen dem α -C und dem Heteroatom der polaren Gruppe:

Appel-Reaktion

(Halogenierung von Alkoholen mit Triphenylphosphan und Halogenverb. wie CCl_4 , Hexachloraceton od. Iod; Alternative zur Verwendung von z.B. PBr_3 od. SOCl_2 ; Spezialfall d. Mukaiyama-Redoxkondensation)

Arbusov-Reaktion

(Alkylierung von Estern dreiwertiger Phosphorsäuren mit Alkylhalogeniden zur Herstellung alkylierter Ester fünfwertiger Phosphorsäuren; $\text{S}_{\text{N}}2$ -Reakt. m. P-Nucleophilen; bei Verwendung von Phosphorigsäureestern $\text{P}(\text{OR})_3$ und $\text{X-CH}_2\text{COOR}'$ entstehen β -Alkoxy-carbonylphosphonsäureester, Edukte für die Horner-W.-E.-Reakt.; Wittig-Horner-Edukte auch herstellbar)

Arndt-Eistert-Synthese

(Kettenverlängerung von Carbonsäuren um eine Methylengruppe mit 2 eq Diazomethan, Ag_2O als Kat. und H_2O od. ROH ; enthält Wolff-Umlagerung als Teilschritt)

Azokupplung

(Kupplung von Diazonium-Ionen mit elektronenreichen Aromaten; Reduktion des Produkts liefert Amine; Alternative zur Sequenz Nitrierung + Reduktion)

Baeyer-Villiger-Oxidation

(Baeyer-Villiger-Umlagerung)
 (Oxidation von Ketonen zu Estern unter Verwendung von H_2O_2 od. einer Persäure; Regioselektivität bei unsymm. Ketonen folgt aus Wanderungstendenz der versch. Reste: $\text{CR}_3 > \text{R}_2\text{CH} > \text{Ar} > \text{RCH}_2 > \text{CH}_3$; Intermediat rechts oben ist das sog. Criegee-Intermediat)

Baldwin-Regeln (Regeln, die den Verlauf von intramolekularen Ringschlußreaktionen vorher-sagen)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ringgröße</th> <th colspan="3">exocyclisch</th> <th colspan="2">endocyclisch</th> </tr> <tr> <th>sp (dig)</th> <th>sp² (trig)</th> <th>sp³ (tet)</th> <th>sp (dig)</th> <th>sp² (trig)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table>	Ringgröße	exocyclisch			endocyclisch		sp (dig)	sp ² (trig)	sp ³ (tet)	sp (dig)	sp ² (trig)	3	-	+	+	+	-	4	-	+	+	+	-	5	+	+	+	+	-	6	+	+	+	+	+	7	+	+	+	+	+
	Ringgröße		exocyclisch			endocyclisch																																				
sp (dig)		sp ² (trig)	sp ³ (tet)	sp (dig)	sp ² (trig)																																					
3	-	+	+	+	-																																					
4	-	+	+	+	-																																					
5	+	+	+	+	-																																					
6	+	+	+	+	+																																					
7	+	+	+	+	+																																					
(+: favorisiert; Ringgröße: Größe des gebildeten Rings; exo/endo: Stellung der Bindung zur Abgangsgruppe relativ zum gebildeten Ring; Hybridisierung des Zentrums, an dem Abgangsgruppe sitzt)																																										
Bamford-Stevens-Reaktion (Alkene aus Tosylhydrazonen)																																										
Barbier-Reaktion (Erzeugung von Organometallverb. aus Halogeniden in Anwesenheit einer Carbonylverb. und in-situ-Reaktion dieser Teilchen miteinander)																																										
Barton-McCombie-Desoxygenierung (Substitution einer OH-Gruppe durch H in zwei Schritten; erst Generierung eines Thioesters, dann radikalische Desoxygenierung mit n-Bu ₃ SnH)	<p>PMHS = polymethylhydrosiloxane</p>																																									
Barton-Reaktion (Oxidation einer Methylgruppe in γ-Stellung zu einem Alkohol zum Aldehyd; Alkohol bleibt erhalten; Nitrit-Ester-																																										

Photolyse; Nitrit-Ester aus Alkohol und Nitrosyl-Chlorid darstellbar)

Baylis-Hillman-Reaktion

(C-C-Bindungsknüpfung zwischen α -Position eines aktivierten Alkens und einem elektronenarmen sp^2 -Kohlenstoff; tertiäre Amine (meist DABCO = 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan) als Kat.)

Beckmann-Umlagerung

(Umlagerung von Oximen zu N-substituierten Carbonsäureamiden)

Benzilsäure-Umlagerung

(Umlagerung von 1,2-Diketonen zu α -Hydroxycarbonsäuren)

Benzoin-Kondensation

(Benzoin aus aromatischen Aldehyden)

Bergman-Cyclisierung

(Cyclisierung von Endiinen unter Aromatenbildung; das Diradikal)

reagiert mit Wasserstoffdonatoren (oft 1,4-Cyclohexadien) zu Aromaten)

Beta-(Silyl-)Effekt
(stabilisiert β -Silyl-Carbokationen; positive Ladung wird durch Hyperkonjugation stabilisiert; ähnliche stabilisierende Orbital-Wechselwirkungen findet man auch in α -Silyl-Carbanionen)

Birch-Reduktion
(Partielle Reduktion aromatischer Verbindungen mit Na od. Li in $\text{NH}_3(l)$; durch Abfangen des intermediären Carbanions mit Elektrophilen (z.B. Alkylhalogeniden) ergibt sich eine Alkylierungsmöglichkeit)

the Birch reduction was followed by *in situ* methylation
see *Tetrahedron Lett.*, **1982**, 23,1095; *J. Org. Chem.*, **1976**, 41, 2649

In this variation, the intermediate carbanion is trapped with iodoethane to give the α -ethyl derivative shown

	<p>10 eq Li, NH₃(l), -78°C; NaOBz; NH₄Cl</p> <p>Li, NH₃(l)/THF (1/1.75), -78°C, 93%</p>
<p>Bischler-Napieralski-Isochinolin-Synthese (Intramolekulare Vilsmeier-Reaktion; unter Wasserabspaltung verlaufende Cyclisierung von 2-Phenylethylamin-acylaten zu 3,4-Dihydroisochinolinen unter dem Einfluß von Phosphorpentoxid, Zinkchlorid u.a. Entwässerungsmitteln)</p>	<p>P₂O₅</p> <p>POCl₃ NaBH₄</p> <p>53%</p> <p>1. POCl₃, benzene, reflux 2. NaBH₄, MeOH</p> <p>86%</p>
<p>Blanc-Reaktion (Chlormethylierung von Aromaten)</p>	<p>ZnCl₂</p>
<p>Bouveault-Blanc-Reduktion (Reduktion von Estern zu prim. Alkoholen mit Na in Ethanol; heute eher unüblich, außer für chemoselekt. Red. von Estern neben Carbonsäuren)</p>	<p>Na, EtOH</p>

Bredt'sche Regel

(Doppelbindungen werden selten zu Brückenkopf-C-Atomen gebildet, da die p-Orbitale der benachbarten sp^2 -hybridisierten C-Atome aus geom. Gründen meist nicht gut überlappen können.)

Brook-Umlagerung

(thermische Umlagerung α -silylierter Carbonylverb. oder anderer Silylverb. (Bsp.: Brook-Uml. in einer Julia-Olefinierungsartigen Reakt.) zu Silylenol-ethern; diese können z.B. in der Mukaiyama-Aldolreaktion eingesetzt werden od. mittels Saegusa-Oxidation (Bsp.) in α,β -unges. Carbonylverb. umgewandelt werden; Triebkraft ist die Bildung einer gegenüber Si-C sehr stabilen Si-O-Bindung)

Brown-Reagenz

(Diisocampheyl-allylboran (Ipc₂B-Allyl), chirales Reagenz zur asymmetrischen Allylierung von Aldehyden (Crotylierung mit Ipc₂B-Crotyl);

Browns Chlorboran (Ipc₂B-Cl) dient der enantioselektiven Reduktion von Carbonylverb.;

Ipc₂B-H wird zur asym-

<p><i>metrischen Hydroborierung eingesetzt)</i></p>	
<p>Bucherer-Reaktion (Überführung von Naphtholen in Naphtylamine durch Erhitzen mit wäßr. Ammoniumsulfid)</p>	<p>The reaction shows 1-naphthol (a naphthalene ring with an -OH group at the 1-position) reacting with $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ and NH_3 to produce 1-naphthylamine (a naphthalene ring with an -NH₂ group at the 1-position).</p>
<p>Bürgi-Dunitz-Prinzip (Annäherung eines Nucleophils an einen Aldehyd (Keton) unter einem Winkel von 109° statt senkrecht; so werden Wechselwirkungen zwischen den π-Elektronen der C=O-Bind. und dem Nu minimiert)</p>	<p>The diagram shows a carbonyl group (C=O) with a nucleophile (Nu) attacking the carbonyl carbon. The angle between the C=O bond and the C-Nu bond is labeled as 109°.</p>
<p>Cadiot-Chodkiewicz-Verfahren (1,3-Diine aus Brom- oder Iodalkinen und terminalen Alkinen in Gegenwart von NEt_3 und CuI (kat.); ähnlich Stephens-Castro-, Cacchi-, Sonogashira-Kuppl.)</p>	<p>The reaction scheme shows Hex-1-yne reacting with CuI (kat.) and NEt_3 to form a copper acetylide intermediate (Hex-C≡C-Cu). This intermediate then reacts with bromoacetylene ($\text{Br-C}\equiv\text{C-Ph}$) to form the final 1,3-diyne product (Hex-C≡C-C≡C-Ph).</p>
<p>Cannizzaro-Reaktion (Disproportionierung von Aldehyden unter dem Einfluß von Alkalien in Alkohol u. Carbonsäure)</p>	<p>The reaction shows 2 molecules of an aldehyde (R-CHO) reacting with a base to produce an alcohol ($\text{R-CH}_2\text{-OH}$) and a carboxylic acid (R-COOH).</p>

CBS-Reduktion
(Corey-Bakshi-Shibata-Reduktion)

(Corey-Itsuno-Verfahren)

(Enantioselektive Reduktion von Carbonylverbindungen mit chiralen Oxazaborolidin-Katalysatoren und achiralen Boranen (BH₃, Catecholboran etc.) als stöch. Reduktionsmittel; der im Bsp. gezeigte Kat. wird als CBS-Katalysator bezeichnet und mit verschiedenen Resten R (H, Me, n-Bu etc.) standardmäßig verwendet)

(je nach Verwendung des (R)- oder (S)-CBS-Katalysators (Bsp. (S)-Kat.) kann man beide Enantiomere des Alkohols gezielt herstellen (oder Umwandlung der Enantiomere über Mitsunobu-Inversion))

Chan-Umlagerung
(???)

Chichibabin-Reaktion

(Tschitschibabin-R.)

(Herstellung von 2-Aminopyridinen u. -chinolinen durch Erhitzen der unsubstituierten Verb. mit Natriumamid (Aminierung; mit Natriumamid in fl. Ammoniak u. KMnO₄ gelingt auch die Aminierung von Di-, Tri- u. Tetrazinen))

Chugaev-Reaktion
(Tschugaeff-R.)

(Olefinbildung durch Eliminierung von Xanthogensäureestern; ähnlich: Selenoxidpyrolyse)

Claisen-Kondensation

(Kondensation von Carbonsäureestern zu β -Ketoestern; Bez. für Alkanolat-katalysierte Kondensationen von Verb. mit aktivierter CH₂-Gruppe u. Estern die zu β -Oxocarbonsäureestern führen können)

(Reaktion 2) ist eine Aldolreaktion)

Claisen-Umlagerung
(herkömmlich)

(thermische Umlagerung von Allylvinylethern bzw. von Allylarylethern zu γ,δ -ungesättigten Aldehyden od. Ketonen bzw. ortho-Allylphenolen, [3,3]sigmatrope Umlagerung; oxo-Cope-Umlagerung)

<p>Claisen-Umlagerung (Eschenmoser-Variante oder Eschenmoser-Claisen) (Verwendung des Dimethylacetals eines Dimethylacetamids und eines Allylkohols, thermische Umlagerung zu γ,δ-ungesättigtem Amid)</p>	
<p>Claisen-Umlagerung (Johnson-Variante oder Orthoester-Variante) (Umsetzung eines Orthoesters mit einem Allylkohol unter sauren Bed. in der Hitze, nach zweimaliger MeOH-Abspaltung entsteht ein γ,δ-unges. Ester)</p>	
<p>Claisen-Umlagerung (Carroll-Variante) (Diketen wird durch einen Allylkohol geöffnet, nach der Umlagerung wird CO_2 abgespalten; es entsteht γ,δ-ungesättigtes Keton)</p>	
<p>Claisen-Umlagerung (Arnold-Variante) (Einsatz von Allylestern, stark basische Bed. nötig; es entsteht</p>	

<p>γ,δ-ungesättigte Carbonsäure)</p>	
<p>Claisen-Umlagerung (Ireland-Variante) (Einsatz von Allyl-estern, allerdings Überführung in Silylketenacetale, Umlagerung bei RT unter neutralen Bed.; H^+ führt am Ende zu γ,δ-ungesättigten Carbonsäuren)</p>	<p>Anfang wie Arnold-Var.</p>
<p>Clemmensen-Reduktion (Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu Kohlenwasserstoffen mit Zn/Hg und HCl; saure Bed.; s.a. Wolff-Kishner-Red.; weitere Alternative: reduct. Entschwefelung von Dithioacetalen mit Raney-Ni/H₂)</p>
<p>Cohen-Verfahren (Reduktive Lithiierung von Alkylarylsulfiden)</p>
<p>Collins-Oxidation (Collins-Reagenz: Py·1/2CrO₃; prim. Alkohole werden zu Aldehyden, sek. Alkohole zu Ketonen oxidiert)</p>

<p>Collman-Reagenz ([Dinatriumtetracarbo- nylferrat(II)] $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CO})_4] \cdot 1.5$ Dioxan)</p>	<p>Bsp.: dient zur Synth. von Carbonyl-Verb., Estern, Amiden u. Carbonsäuren aus Alkyl- u. Acylhalogeniden od. Carbonsäuren; hohe Ausbeuten, Toleranz anderer funkt. Gruppen (Ketone, Nitrile etc.); Umpolung: Carbonylkohlenstoff reagiert als Nucleophil</p>
<p>Cope-Eliminierung (Eliminierung von Aminoxiden (aus Amin- en durch Ox. z.B. mit H_2O_2) zu Olefinen)</p>	<p>(syn-Elim., die nach einem zur Cope-Elim. analogen Mechanismus verläuf)</p>
<p>Cope-Umlagerung (therm. Isomerisierung von 1,5-Dienen, konzertierte [3.3]sigmatrope Umlagerung; trägt das Edukt in 3- oder 4-Position einen Substituenten (z.B. OH), mit dem die neue Doppelbindung ein konjugiertes System ausbilden kann, so verläuft sie besonders gut und irreversibel, da das Cope-Produkt zum Aldehyd od. Keton tautomerisiert (oxy-Cope-Variante, s. Bsp.))</p>	<p>TDS = thexyldimethylsilyl</p>
<p>Corey-Fuchs-Verfahren (Transformation eines Aldehyds in ein Alkin)</p>	<p>Corey-Fuchs-Verfahren</p>

Curtius-Umlagerung

(Abbau von Säureaziden zu Isocyanaten $R-N=C=O$; diese können dann weiter umgewandelt werden, z.B. in Amine)

1,3-Dipolare Cycloaddition

(Cycloaddition eines 1,3-Dipols an eine elektronenarme Mehrfachbindung zu einem fünfgliedrigen Heterocyclus, z.B. Zwischenschritt bei Ozonolyse)

[2+2]Cycloaddition

(Photochemische Dimerisierung von Alkenen)

Danishefsky-Dien

(spezielles, funktionalisiertes elektronenreiches Dien für Diels-Alder-Reaktionen; die

entstehenden Tri-methylsilyl-Enolether können leicht zu Ketonen hydrolysiert werden)

Darzens-(Glycidester)-Kondensation

(α,β -Epoxy-carbonsäureester aus Carbo-nylverb. und α -Halo-genestern)

DDQ

(4,5-Dichlor-3,6-dioxo-cyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril, DDQ = Dichlorodicyanoquinone; Reag. zur oxidat. Abspaltung von p-Methoxybenzyl(PMB)-Schutzgruppen (Alternative: CAN Cer(VI)-ammoniumnitrat $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6$, BnO wird mit DDQ od. CAN nicht gespalten))

(Findet in der org. Synth. zur Einführung von Doppelbindungen durch Dehydrierung, zur Oxidation von Hydroxy-Gruppen, zur Aromatisierung sowie bei Cyclisierungen Verwendung. Oxidationsmittel: wird zum Hydrochinon reduziert.)

Dehydratisierung von Alkoholen

(a) Mesylatbildung und Eliminierung mit Base (MsCl/NEt_3)

(b) mittels Burgess-Reagenz (u. NEt_3)

c) mittels Martins Persulfuran)
 (Aktivierung einer OH-Gruppe als Abgangsgruppe auch durch Protonierung oder Lewissäure (saure Bed.) mögl.;
 Hofmann- vs. Saytzev-Produkt)

Delépine-Reaktion
 (Primäre Amine durch Reaktion von Alkylhalogeniden mit Hexamethylen-tetramin (Urotropin))

Demjanov-Umlagerung
 (Umlagerung von Carbokationen, die durch N₂-Abspaltung aus Diazoniumionen (aus Aminen durch Diazotierung) gewonnen werden; verläuft unter Ringerweiterung oder -verengung)

Dess-Martin-Periodinan-Oxidation
 (milde Oxidation primärer und sekundärer Alkohole zu Aldehyden bzw. Ketonen; selektive Oxidation primärer neben sekundären Alkoholen möglich, Ox. α,β-unges. Alkohole möglich; basenfrei, aber schwach sauer)

	<p>1. Dess-Martin Reagent $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{MeCN}$ 2. aq. NaHCO_3</p> <p>74%</p> <p>Dess-Martin Reagent</p>
<p>Diazotierung (Diazoniumsalze aus primären aromatischen Aminen)</p>	$\text{Ar-NH}_2 + \text{HONO} \longrightarrow \text{ArN}^+\equiv\text{N}$
<p>Dieckmann-Kondensation (intramolekulare Claisen-Kondensation)</p>	<p>$(\text{H}_2\text{C})_n$ $\xrightarrow{+\text{NaOR}}$ $(\text{H}_2\text{C})_n$ $\xrightarrow{-\text{OR}^-}$</p> <p>$(\text{H}_2\text{C})_n$ $\xrightarrow{+\text{H}^+, \Delta}$ $(\text{H}_2\text{C})_{n+1}$ $\xrightarrow{-\text{CO}_2, -\text{R-OH}}$</p> <p>90%</p>

Diels-Alder-Reaktion

([4+2]Cycloaddition;
endo-Präferenz; cis-Prinzip)

**Di-π-Methan-Umlagerung
(Zimmerman-Umlagerung)**

(Photochemische Umlagerung von 1,4-Dienen zu Vinylcyclopropanen)

Dötz-Reaktion
 (Benzoanellierung über
 Chrom-Carben-Kom-
 plexe)

Edman-Abbau
 (Sequenzbestimmung
 von Oligopeptiden
 durch Abbau vom N-
 terminalen Ende aus
 mit PhN=C=S;
 CF₃COOH (kalt), NEt₃;
 CF₃COOH (heiß))

Enderssches RAMP/SAMP-Verfahren

(Verfahren zur Gewinnung enantiomerenreiner α -alkylierter Carbonylverb. über chirale Aza-Enolate; als chirale Reagenzien werden die von (R)-/(S)-Prolin abgeleiteten (R)-/(S)-Aminoprolinolmethylether (RAMP/SAMP) eingesetzt; bes. gut geeignet für Aldehyde, da deren Überführung in Enolate oft nicht quantitativ gelingt und so Aldolnebenreaktionen auftreten)

En-Reaktion

(Addition einer elektronenarmen Doppelbindung (Enophil) an ein Olefin mit allylischem Wasserstoffatom (En))

Erlenmeyer-Regel

(Aus Molekülen mit zwei OH-Gruppen an einem C-Atom wird in der Regel Wasser eliminiert und es bildet sich eine Carbonylgruppe)

Eschenmoser-Tanabe-Fragmentierung

(Alkinone mit 1,5-Abstand zwischen Keton und Dreifachbindung aus α,β -Epoxyketonen und

Hydrazinderivaten; erst entstehen Hydrazone, die anschließend fragmentieren)

Esterpyrolyse
(Olefine durch Pyrolyse von Carbonsäureestern)

Evans-Aldol-Reaktion

(Asymmetrische Aldolreaktion; die Stereoselektivität wird meist allein vom chiralen Oxazolidinon-Evans-auxiliar an der Enolatkomponente kontrolliert; man erhält nur syn-Aldole; Verwendung von Borenolaten; die Auxiliare werden aus enantiomerenreinem Valinol, Phenylalaninol od. Norephedrin synthetisiert;

über die Heathcock-Variante, bei der mit Lewis-Säuren (z.B. AlEt_2Cl) vorkomplexierte Aldehyde mit den Evansschen Borenolaten umgesetzt werden, erhält man anti-Aldole; eine weitere asymm. Aldolreaktion, die chirale Hilfsgruppen am Enolat verwendet, ist die Masamune-Aldolreaktion)

Evans-Synthese α -chiraler Carbonsäuren

(Synthese enantiomerenreiner α -alkylierter Carbonsäuren mit Hilfe verschiedener chiraler Evans-Auxiliare und der stereoselektiven Bildung der Z-Enolate; ein ähnliches Verfahren ist das Helmchen-Verfahren mit einem Propionsäureester eines Campherderivats)

Favorskii-Umlagerung

(Wallach Degradation)

(Umlagerung von α -Halogenketonen mit Alkoholaten zu Carbonsäureestern; verwendet man Hydroxide od. Amine als Basen, erhält man Säuren bzw. Amide)

Felkin-Anh-Modell

(Modell zur Vorhersage des stereochemischen Verlaufs des Angriffs eines Nucleophils auf einen α -chiralen Aldehyd)

<p>Fétizon-Reagenz (???)</p>	<p>$\text{Ag}_2\text{CO}_3 / \text{Celite}$ $\text{CH}_2\text{Cl}_2, \text{NEt}_3$</p>
<p>carbon-Ferrier-Umlagerung (???)</p>	<p>$\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ MeCN</p> <p>97%</p>
<p>Finkelstein-Reaktion (Umhalogenierung von Alkylhalogeniden; oft mit NaI in Aceton; eine Umwandlung R-OTf nach R-I auch mögl.)</p>	<p>$\text{KI}, 18\text{-crown-6}$ 135°C</p> <p>90%</p>
<p>Fischer-Indol-Reaktion (Indole aus Arylhydrazonen durch Erhitzen in Gegenwart eines Katalysators (MHal, bes. ZnCl_2, Lewissäuren))</p>	<p>PhNHNH_2 $\text{AcOH}, \text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$</p> <p>80%</p>
<p>Fischer-Veresterung (saure Veresterung; reversibel)</p>	<p>1. $\text{H}_2\text{O}_2, \text{LiOH}, \text{H}_2\text{O}$ (Hydrolyse d. Imids zur Carbonsäure) 2. $\text{EtOH}, (\text{EtO})_3\text{CH}, \text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$</p> <p>95%</p>
<p>Fleming-Tamao-Oxidation (???)</p>	<p>1. 3 eq. $\text{BF}_3 \cdot 2 \text{AcOH}$ $\text{CH}_2\text{Cl}_2, 40^\circ \text{C}$ 2. $\text{H}_2\text{O}_2, \text{KF}, \text{NaHCO}_3$ $\text{THF/MeOH}, \text{heat}$</p> <p>89% x 97%</p>

	<p style="text-align: right;">47% overall</p> <p style="text-align: center;">Tamao oxidation</p>
<p>Friedel-Crafts-Acylierung (Acylierung von Aromaten mit aktivierten Carbonsäurederivaten (Chloride, Anhydride) unter Lewisäure-Katalyse)</p>	<p style="text-align: center;">86%</p>
<p>Friedel-Crafts-Alkylierung (Alkylierung von Aromaten mit Alkylhalogeniden (-triflaten etc.) unter Lewisäure-Katalyse; Problem: Produkte reaktiver als Edukte)</p>	<p style="text-align: right;">48%</p> <p>(Edukt üblicherweise nicht Alkohol, sondern Halogenid oder Triflat.)</p>
<p>Friedländer-Chinolinsynthese (Kondensation von o-Aminobenzaldehyden mit Carbonylverbindungen)</p>	<p style="text-align: right;">+ H₂O</p>
<p>Fries-Umlagerung (Umlagerung von Phenylestern zu Acylphenolen, meist mit kat. AlCl₃)</p>

<p>Note: 0% yield with AlCl_3 unless a huge excess is used</p>
<p>Fritsch-Buttenberg-Wiechell-Umlagerung (Umlagerung von Olefinen zu Alkinen) (???)</p>
<p>Gabriel-Synthese (Primäre Amine durch Spaltung von Phthalimiden)</p>
<p>Garner-Aldehyd (???)</p>	<p>Garner aldehyde 84% 1:3.5 diastereomere</p>

<p>Gattermann-Synthese (Formylierung von Aromaten; Alternative: Vilsmeier-Haack)</p>
<p>Gattermann-Koch-Synthese (Formylierung von Aromaten)</p>
<p>Gilman-Cuprate (z.B. Me_2CuLi; Cuprate dienen als Quellen von C-Nucleophilen, sie sind in der Lage Abgangsgruppen (OTf etc.) an sp^2-C-Atomen zu substituieren (-20°C), Epoxide werden erst bei RT geöffnet; Reaktion erfolgt mit Säurechlorid, aber nicht mehr mit Keton; selektive 1,4-Addition an α,β-unges. Ketone, wie auch Normant- und Knochel-Cuprate; Knochel-Cuprate reagieren mit Aldehyden und dulden viele funkt. Gruppen (Ester, Keton, Cyano, Chlor, Amine, Amide, Dreifachbind.) = Vorteil von Zn-Reagenzien gegenüber Li- und Grignard-Reagenzien, ähnliche Reaktivität wie Ti-Organyle)</p>	<p>Normant-Cuprat: $(\text{H}_2\text{C}=\text{CH})_2\text{Cu}^+\text{MgBr}$ Knochel-Cuprat: $\text{NCCH}_2\text{CH}_2\text{Cu}(\text{CN})^-\text{ZnH}_3$</p>

Glaser-Reaktion

(Eglinton-Kupplung)

(Kupplung von terminalen Alkinen;

Glaser: Cu(I)-Salz als Kat., NH₄OH-Lsg., Luft als Ox.mittel zu Cu(II)

Eglinton: stöch. Cu(II)-Salz, Pyridin als Base)

could not purify due to insolubility

Glycolspaltung

(Oxidative Spaltung vicinaler Diole;

Blei(IV)-acetat wird in org. LM eingesetzt, in wäßr. Lsg. kann man Periodsäure HIO₄ verwenden (Malprade))

Gomberg-Bachmann-Reaktion

(Synthese unsymmetrischer Biphenyle; das entstehende Phenylradikal kann auch mit anderen vorhandenen subst. Aromaten weiterreagieren)

Grignard-Reaktion

(Addition von magnesi-umorganischen Verbindungen an polare Mehrfachbindungen)

<p>Grob-Fragmentierung (Doppelte ap-Eliminierung)</p>	<p style="text-align: right;">Grob-type fragmentation</p>
<p>Haller-Bauer-Reaktion (Nicht enolisierbare Ketone der Form Ar-CO-CR₃ werden durch Natriumamid in einen arom. Kohlenwasserstoff u. ein Amid einer sterisch aufwendig substituierten Carbonsäure gespalten) (2. Bsp. etwas abgewandelte Version)</p>	<p>1. NaNH₂ 2. H₂O</p> $\text{Ar}-\text{C}(=\text{O})-\text{CR}_3 \longrightarrow \text{Ar}-\text{H} + \text{R}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$ <p style="text-align: center;">(3) : (7) 65-70%</p> <p style="text-align: center;">isolated as methyl ester after treatment with diazomethane</p>
<p>Haloform-Reaktion (Oxidative Spaltung von Methylketonen (und Acetaldehyd) zu Carbonsäuren mit Halogenen X₂ (X = Cl, Br, I) und Base)</p>	
<p>Hammond-Postulat (Aussage über die Gestalt des Übergangszustands chemischer Reaktionen)</p>	<p>Bei einer endergonischen Reaktion ähnelt der ÜZ energetisch und strukturell den Produkten; endergonische Reaktionen verlaufen also über späte ÜZ. Umgekehrt ähnelt bei einer exergonischen Reaktion der ÜZ energetisch und strukturell den Edukten; exergonische Reaktionen verlaufen also über frühe ÜZ.</p> <p>Die unterschiedlichen Energien möglicher Produkte einer Reaktion beeinflussen die ÜZ endothermer (endergonischer) Reaktionen also sehr stark (produktähnliche ÜZ), während bei exothermen (exergonischen) Reaktionen</p>

die frühen ÜZ alle sehr eduktähnlich und somit untereinander alle sehr ähnlich sind. Als Folge davon unterscheiden sich weniger reaktive, endotherme Reaktionen stärker in den zu den versch. mögl. Produkten gehörenden ÜZ voneinander als exotherme Reaktionen und verlaufen daher selektiver (**Reaktivitäts-Selektivitäts-Prinzip**).

Heck-Reaktion

(Pd-katalysierte Arylierung/Alkenylierung von Olefinen; als Alkenylierungs-/Arylierungs-Reagentien kommen Aryl-, Hetaryl-, Alkenyl-, Benzylhalogenide od. -trifluormethansulfonate in Frage; trans-selektiv, isomerisierungsfrei)

Hell-Volhard-Zelinskii-Reaktion

(α -Halogenierung von Carbonsäuren; statt P können auch die Phosphortrihalogenide verwendet werden)

Hendrickson-McMurry-Reagenz

(N-Phenylbisimid der Trifluormethansulfonsäure Tf_2NPh ; in Verbindung mit einer Base (LDA, KHMDS etc.) dient es zur Generierung von Enoltriflaten, möglichen Substraten für Pd-vermittelte C,C-Kupplungen)

Henry-Reaktion

(Nitroaldol-Reaktion; RCH_2NO_2 als methylenaktive Komponente; es existiert enantiose-

lekt. katalysierte Variante mit Heterodimetallkatalysatoren)

Hofmann-Eliminierung

(Umwandlung von Aminen in Olefine durch Eliminierung; therm. Spaltung eines quartären Ammoniumhydroxids in ein Olefin u. ein tertiäres Amin; Hofmann vs. Saytsev)

Hofmann-Umlagerung

(Abbau von Carbonsäureamiden zu primären Aminen, die 1 C-Atom weniger enthalten; Oxid. des Amids mit Br₂ od. Cl₂ in alkal. Lsg. führt zur Bldg. eines Isocyanates; aus diesem entsteht dann durch Wasser-Addition u. anschließende Decarboxylierung der gebildeten Carbaminsäure das Amin)

Horner-Wadsworth-Emmons-Olefinierung

(C=C-bildende Kondensation zwischen dem Li-Na- oder K-Salz eines β-Keto- oder β-(Alkoxy-carbonyl)phosphon-

säuredialkylesters und einem Aldehyd (Keton) bzw. allg. zw. Aldehyd und anderen metallierten Phosphonsäuredialkylestern (mit Subst. m. -M-Effekt am Carbanionzentrum: Alkenyl, CN etc.); es entstehen α,β -unges. Ketone bzw. Ester; trans-Selektivität)

Horner-Wadsworth-Emmons-Olefinierung

(Still-Gennari-Variante)

(Verwendung von $(\text{F}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{O})_2\text{P(O)R}$ und K-haltigen Basen (KHMDS etc.) und 18-Krone-6; cis-Selektivität)

Hückel-Regel

(In cyclisch konjugierten planaren Verbindungen mit $(4n+2)$ π -Elektronen kann nach Hückel aromatisches Verhalten erwartet werden.)

Hünig-Base

(Ethyl-di-isopropylamin DIEA; starke, wenig nucleophile Base, die in Eliminierungs-Reaktionen eingesetzt wird; andere N-Basen m. ähnlichen Eigensch.: DBN, DBU u. 2,6-Di-tert.-butylpyridin)

Hunsdiecker-Reaktion

(Decarboxylierung von Carbonsäure(silber)-salzen; X meist Br)

Hydroborierung

(Addition von Boranen an Olefine; syn-stereospezifisch, regioselektiv: B an weniger gehindertem Zentrum (anti-Markownikow); höhere Regioselektivität mit 9-BBN; mit chiralen Borreagenzien (z.B. Ipc_2BH) sind asymmetrische Hydroborierungen möglich; siehe auch CBS-Reduktion)

<p>9-Borabicyclo[3.3.1]nonan (9-BBN)</p> <p>α-Pinen</p> <p>(+)-Di-3-pinanylboran (Diisopinocampylboran) [(IPC)₂BH] (geeignet für stereoselektive H)</p> <p>Boran-dimethylsulfid-Komplex</p> <p>Thexylboran (1,1,2-Trimethylpropylboran)</p> <p>Catecholboran (1,3,2-Benzodioxaborol)</p>
<p>Hydroperoxid-Umlagerung</p> <p>(Tertiäre Hydroperoxide lagern sich im Säuren um; Cumolhydroperoxidumlagerung (Bsp.) dient zur techn. Synthese von Phenol und Aceton)</p>	<p>PhOT</p>
<p>Iodolactonisierung</p> <p>(Lactonisierung mit Iod und einer Base in einer Verb. mit COOH und C=C-Bindung über Iodonium-Stufe (Stereo-kontrolle durch stereospez. Öffnung des Iodonium-Ions); Dehalogenierung z.B. mit Bu₃SnH od. (Me₃Si)₃SiH und AIBN; analog: Bromlact. bzw. -veretherung)</p>	<p>(Es entsteht natürlich ein Racemat als Produkt.)</p>

Jacobsen-Epoxidierung

(Asymmetrische Epoxidierung mit NaOCl (aq.) und dem Jacobsen-Kat.; Selektivität über einfaches Schema vorhersagbar (s. Bild))

Jones-Oxidation

(Jones-Reagenz: CrO_3 , verd. H_2SO_4 , Aceton; sekundäre Alkohole werden zu Ketonen und primäre Alkohole (meist) zu Carbonsäuren oxidiert)

Julia-Epoxidierung (???)

Julia-(Lythgoe-) Olefinierung

(C=C-Bildung durch Addition α -lithierter primärer Alkylphenylsulfone an Aldehyde und anschließende Umsetzung der Lithiumalkoholate mit

Acetanhydrid zu (β -Acetoxyalkyl)phenylsulfonen und Reduktion mit Na/Hg; trans-Produkt überwiegt bei weitem)

Keck-Allylierung

(Allylierung von Aldehyden mit Allyl-Tributylzinn und BF_3 -Etherat (bzw. Lewisäure), Stereokontrolle bei chiralem Aldehyd durch 1,2-*asymm.* Induktion (Felkin-Anh) und 1,3-*asymm.* Induktion (Evans-Modell))

Knoevenagel-Kondensation

(Kondensation von Aldehyden oder Ketonen mit aktiven Methylenverbindungen oder Nitromethan (hier *anschl. E1_{cb}-Elim.*); Kondensation *m. Nitroalkanen* wird oft als *Henry-R.*, die mit Phosphonsäuredialkylestern als *Horner-W.-E.-R.* u. die mit Lithiumtrimethylsilylalkanen als *Peterson-Olefinierung* bezeichnet)

(Reakt. in schwach basischem (z.B. Piperidin) od. neutralem (z.B. Piperidiniumacetat) Milieu)

Kolbe-Nitril-Synthese

(Nitrile aus Alkylhalogeniden; erwärmen einer wäfr. alkohol. Lsg. eines Alkalicyanids (z.B. NaCN) mit einem Alkylhalogenid; unter $\text{S}_{\text{N}}1$ -Bedingungen)

können, z.B. mit tert.-Alkylhalogeniden, auch Isonitrile entstehen)

Kolbe-Schmitt-Reaktion

(Carboxylierung von Phenolaten – Salicylsäure-Synthese)

Krapcho-Decarboxylierung

(Decarboxylierung geminaler Carbonsäureestergruppen mit LiCl (NaCl) in H₂O und DMSO in der Hitze)

Kulinkovich-Reaktion

(Cyclopropanierung in Gegenwart einer Ti-organischen Spezies u. nach Grignard-Reakt.) (???)

Lemieux-Johnson- u. Lemieux-von Rudloff-Oxidation

(Oxidative Spaltung von Olefinen; Alternative zur Ozonolyse)

Leuckart-Wallach-Reaktion

(Reduktive Aminierung einer Carbonylverbindung mit einem sek. Amin und Ameisensäure)

Lindlar-Katalysator

(mit $\text{CaCO}_3/\text{PbO}/\text{Chinolin}$ od. mit BaSO_4 vergifteter Pd-Kat. für Hydrierungen; cis-Hydrierung von Alkinen zu Alkenen möglich)

Lossen-Umlagerung

(Umlagerung von Hydroxamsäuren in Isocyanate; letztere lassen sich zu prim. Aminen hydrolysieren)

Luche-Reduktion

(Luche-Reagenz: Natriumborhydrid, Certrichlorid; chemoselektive Reduktion einer Keto-funktion neben einer Aldehydfunktion möglich, da nur elektronenreicheres Keton selektiv komplexiert und so aktiviert wird; Red. eines Aldehyds neben einem Keton ist mit NaBH_4 bei -78°C mögl.)

<p>Majetich-Cyclobutan-Anellierung (???)</p>	<p>0.2 Bu₄NF, DMF (0.3 M) 5 HMPA powdered 4Å sieves</p> <p>65%</p>
<p>Malonester-Synthese (Alkylierung von Malonsäureestern (methyleneakt. Verb.) mit Alkylhalogeniden und Base)</p>	<p>Malonester</p> <p>Malonsäuredinitril, Acetessigester, Cyanessigester</p>
<p>Mannich-Reaktion (Aminomethylierung C-H-acider Verbindungen mit Aldehyden und Aminen; Produkte heißen Mannich-Basen und sind wichtige Zwischenstufen in Synthesen; intramolekulare Variante: Mannich-Cyclisierung, Pictet-Spengler-Reaktion)</p>	<p>Imminium-Ion</p> <p>Enol-der akt. Wasserstoff-Komponente</p> <p>Keto-Form</p> <p>Tropinon</p>

Matteson-Reaktion

(Matteson-Boronsäureesterhomologisierung)

(Umsetzung von Boronsäureestern $RB(OR^*)_2$ mit Dichlormethyl lithium $LiCHCl_2$, die zu einem Einschub der $CHCl$ -Einheit in die Kohlenstoff-Bor-Bindung $R-B$ führt; Einschub erfolgt unter $ZnCl_2$ -Katalyse hochstereoselekt.; anschl. Addition eines Alkylolithium- oder Grignardreagenzes führt zu Substitution des zweiten Cl -Atoms unter vollständiger Inversion; diese Sequenz kann wiederholt werden; bei Verwendung chiraler Boronsäureester $RB(OR^*)_2$ (z.B. mit Pinandiolen) können neue Stereozentren selektiv aufgebaut werden)

(Bei Verwendung der aus (+)- α -Pinen stammenden Hilfsgruppe erhält man im Additions-Umlagerungsschritt erfahrungsgemäß ein (*S*)-konfiguriertes Zentrum.)

McMurry-Kupplung

(Reduktive Kupplung von Aldehyden und Ketonen mit niederwertigem Titan zu Olefinen;

Ti-vermittelte Pinakol-Kupplung)

Meerwein-Ponndorf-Verley-Reaktion

(Reduktion von Aldehyden oder Ketonen mit Aluminiumtris(isopropylat) als Kat. in *i*-Propanol;

Rückreaktion Oppenauer-Oxidation: Al-tert-butylat mit Aceton auf Alkohol einwirken lassen)

Meerwein-Salze

(Trialkyloxonium-Salze z.B. $[(\text{H}_3\text{C})_3\text{O}]^+\text{BF}_4^-$, die als starke Alkylierungsmittel in der org. Chemie Verw. finden)

Michael-Addition

(1,4-Addition C-H-acider Verbindungen (+Base, d.h. von Enola-

ten) an α,β -ungesättigte Carbonylverbindungen (bzw. akzeptorsubst. Olefine) zu 1,5-Diketonen)

Mitsunobu-Reaktion

(Veresterung (Kondensation) von Alkoholen mit Carboxylaten (Nucleophilen) mittels Dialkylazodicarboxylaten (z.B. DEAD) und Triphenylphosphin unter Inversion (S_N2); anschließende Verseifung führt zum invertierten Alkohol (Mitsunobu-Inversion))

(Mitsunobu-Alkylierung: bei Verwendung als Alkylierung)

(aus ω -Hydroxycarbonsäuren erhält man so in guten Ausbeuten und unter Inversion Lactone; diese Redox-Kondensation ist auch zur Synth. von Makro(dio)liden gut geeignet)

Mosher's Acid

(wird verwendet, um die Enantiomerenreinheit von Alkoholen und Aminen zu bestimmen (NMR); weiterhin Bestimmung der absoluten Konfiguration organischer Verb. mittels Mosher-Estern und NMR-Spektroskopie mögl.)

Mukaiyama-Aldolreaktion

(Aldolreaktion, bei der als Enolatkomponente Silylenolether eingesetzt werden; die Reaktion verläuft nur unter Lewis-Säure-Katalyse ab; bei Verwendung chiraler Aldehyde läßt sich die Stereoselektivität nach dem Felkin-Anh-, Cram-Chelat- od. Evansschen 1,2-/1,3-asymm. Induktionsmodell erklären; bei Verwendung einer chiralen Lewis-Säure liegt eine enantioselectiv katalysierte Reaktion vor)

Mukaiyama-Redoxreaktion

(Reaktion von Alkoholen (RR'OH), Ph₃P und Verbindungen X-Y zu einem Substitutionsprodukt RR'X, Ph₃P=O und H-Y; Inversion; Abgangsgruppe am Alkohol analog Mitsunobu-Inversion)

Nazarov-Cyclisierung

(Cyclisierung von Divinyl- od. Allylvinylketonen zu Cyclopentenonen; gleiche Prod. wie bei Pauson-Khand-R.; bei Verwendung Trimethylsilyl-substituierter Verb. können Produktgemische vermieden)

werden (Denmark-Variante))

Neber-Reaktion

(α -Aminoketone aus Ketoximtosylaten; über Azirin-Intermediat)

(Im einen Bsp. wird das Azirin-Intermediat und nicht das Aminoketon als Produkt erhalten.)

Nef-Reaktion

(Carbonylverbindungen aus Nitroalkanen; macht nucleophile Acylierungen möglich; Umpolung)

**Nozaki-(Takai)-
Hiyama-(Kichi)-
Reaktion**

(Umsetzung von Vinyl-, Allyl-, Aryl- und Alkinylhalogeniden (I, Br) mit Cr(II)- und Ni(II)-chlorid und Aldehyden zu Allylkoholen; Organochrom(III)-Alkenylverb. greift chemoselekt. Aldehyde an, keine Ketone, Ester oder Nitrile)

Noyori-Reduktion

(Asymmetrische homogene, katalytische Reduktion mit dem Reagenz (R)-BINAL-H (od. (S)-BINAL-H); ein Keton, das einen unges. Substituenten tragt, wird enantioselektiv zum Alkohol reduziert)

(weitere Reduktion nach Noyori: mit [(S)-BINAP)RuCl₂]₂-NEt₃ und Wasserstoff bzw. allg. BINAP-haltigen Edelmetallkatalysatoren und H₂ fur homogene asymm. Hydrierungen (=Noyori-Hydr.); auch Hydr. von Doppelbind. moglich)

Nysted-Reagenz

(Olefinierung von Carbonylverbindungen)

(???)

Oxidationen von Alkoholen und Aldehyden <i>(kurze Übersicht über Verfahren, C=C-Bindungen werden von diesen Methoden nicht angegriffen)</i>				
	Oxidationsmittel	sek. Alk. zu Keton	prim. Alk zu Aldehyd	prim. Alk zu Carbonsäure
	K ₂ Cr ₂ O ₇ , verd. H ₂ SO ₄	j	n	j
	Jones-Reagenz	j	z.T.	j
	Collins-Reagenz	j	j	n
	Pyridiniumchlorochromat (PCC)	j	j	n
	Pyridiniumdichromat (PDC)	j	j	n
	Swern-Oxidation	j	j	n
	Dess-Martin-Oxidation		j	
	TPAP		j	
	TEMPO		j	
	MnO₂-Oxidation Oxidation von Benzyl- oder Allylalkoholen mit MnO ₂ zu entsprechenden Aldehyden (Ar-CHO bzw. α,β-unges. Aldehyd)			
Oxidationen von aktivierten C-H-Bindungen etc. <i>(exemplarische Auswahl einiger Methoden)</i>	Substrat	Produkt	Reagens/Methode	
	Allylische C-H (Allyl-H = CH ₂ CHCH ₂ -H)	Allyl-Br Allyl-OH Allyl-OH	NBS ¹ O ₂ /S ₂ O ₃ ²⁻ (En-R.) SeO ₂ /H ₂ O	
	Benzylische C-H (Bn-H = Ar-CH ₂ -H)	Ar-CH ₂ -Br Ar-COOH Ar-CHO	NBS KMnO ₄ /OH ⁻ od. Na ₂ Cr ₂ O ₇ /H ₂ SO ₄ 1. CrO ₃ /Ac ₂ O 2. H ₂ O	
	α-C-H RC(O)CH ₃ RC(O)CH ₂ R'	RC(O)C(O)H RC(O)C(O)R'	SeO ₂ 1. NaNO ₂ /H ⁺ 2. Hydrolyse	
	Dihydroxylierungen von Olefinen cis -Dihydroxylierung mit OsO ₄ (kat.)/NMO (od. KMnO ₄) trans -Dihydroxylierung über Epoxidierung (MCPBA) und anschließende Epoxidöffnung mit OH ⁻ /H ₂ O od. H ⁺ /H ₂ O			
	CAN-Oxidation Cer(VI)ammoniumnitrat (NH ₄) ₂ Ce(NO ₃) ₆ ist starkes Oxidationsmittel: a) Oxidation von Hydrochinonen zu Chinonen b) oxidative Abspaltung von PMB-Schutzgruppen (s.a. DDQ)			

Ozonolyse

(Bindungsbruch einer C-C-Doppelbindung durch Einwirken von Ozon; verschiedene Produkte je nach Aufarb.: Carbonsäuren bzw. Ketone (H_2O_2), Carbonylverb. (Me_2S od. PPh_3 od. $Zn/HOAc$), Alkohole ($NaBH_4$, $LiAlH_4$))

Parikh-Doering-Oxidation

(Oxidation prim. Alkohole zu Aldehyden mit Pyridin, SO_3 , DMSO; ähnlich der Swern-Oxidation) (???)

Paternò-Büchi-Cyclisierung

(photochemische Cycloaddition (meist radikal.) einer Carbonylverbindung an ein Alken)

Pauson-Khand-Reaktion

(Synthese von Cyclopentenonen aus einem Alkin und einem Alken in Gegenwart von

$\text{Co}_2(\text{CO})_8$, das CO liefert und das Alkin komplexiert, formal [2+2]Cycloaddition, exo-Präferenz, intramolek. möglich)

Payne-Umlagerung

(Reversible, baseninduzierte Epoxid-Umlagerung bei α -Hydroxyepoxiden (z.B. aus Sharpless-Epoxidierung); Möglichkeit der Subst. der 1-Hydroxygruppe durch Nucleophile)

Pearlman-Katalysator

(Hydrierkatalysator; mit $\text{Pd}(\text{OH})_2/\text{Kohle}$ lassen sich bequem N-Benzyl-Gruppenbindungen spalten) (Bsp.???)

Pechmann-Kondensation

(Cumarin-Synth. durch Kondensation von Phenolen mit 3-Oxocarbonsäureestern in Ggw. von Lewis-Säuren od. wasserentziehenden Mitteln wie H_2SO_4 , P_2O_5 , AlCl_3 , POCl_3 , HF etc.)

Perkin-Reaktion

(Kondensation aromatischer Aldehyde mit Säureanhydriden)

Peterson-Olefinierung

(„Silyl-Wittig-Reakt.“;
 Synthese von Olefinen
 aus Ketonen oder Alde-
 hyden und α -Silylcarb-
 anionen, erst entstehen
 β -Hydroxysilane, die
 dann durch Eliminie-
 rung Olefine bilden;
 Umsetzung einer α -
 Silylorganometallverb.
 $M-C(R)(R')(SiMe_3)$ (mit
 $M=Li, Mg$ etc.) mit
 einem Keton oder Alde-
 hyd; je nach Aufarb.
 (sauer/basisch) über-
 wiegt E oder Z: sauer
 (F_3B-OEt_2) anti-Elim.,
 basisch (KH) syn-Elim.)

Pictet-Spengler-Cyclisierung (intramolekulare Mannich-Reaktion)

"one-pot" reaction - Pictet-Spengler
 followed by Diels-Alder

Pinakol-Kupplung

(Reduktive Kupplung zweier Carbonylverb. zu einem Diol mit Mg; es existiert neben der McMurry-Variante auch eine SmI₂-vermittelte Reaktion)

Pinakol-Umlagerung

(Umlagerung von vicinalen Diolen; im 2. Bsp.: ein nach einer Cyclisierung auftretendes Intermediat, das eine Pinakol-Umlagerung eingeht)

Prilezhaev-Reaktion

(Epoxidierung von Alkenen mit Peroxycarbonsäuren (z.B. MCPBA) zu Oxiranen; milde Bed. und gute Ausbeuten; oxidationsempfindl. Gruppen dürfen nicht vorhanden sein, Carbonyle können eine Baeyer-Villiger-Oxidation eingehen)

Prins-Reaktion

(Carbonyl-En-Reaktion; (Lewis-) säurekatalysierte Addition eines Aldehyds (i.a. Formaldehyd) an eine C=C-Bind.; je nach Reaktionsbedingungen entstehen Allylalkohole, 1,3-Glykole od. 1,3-Dioxane (vgl. Hydroxymethylierung);

Carbonyl-En-Reaktion
 ist Teilschritt des
Takasago-Prozesses zur
 Herstellung von (-)-
 Menthol (Bsp.) aus β -
 Pinen, hier entsteht ein
 Homoallylalkohol)

Reppe-Chemie

(Eine Reihe techn.
 wichtiger Reaktionen
 des Acetylens; Bsp.: die
 Vinylierung zu
 Vinylacetat, Vinyl-
 ethern, Acrylonitril u.
 Vinylpyrrolidon, die
 Ethinylierung zu
 Propinol, Methylbutinol
 od. Butindiol, die
 Hydrocarbonylierung
 zu Hydrochinon, die
 Hydrocarboxylierung
 zu Acrylsäure, die
 Cyclooligomerisation zu
 Benzol od. Cycloocta-
 tetraen)

Ramberg-Bäcklund-Umlagerung

(Umlagerung von α -Halogensulfonen zu Olefinen unter Einwirkung von Base; E/Z-Produktverhältnis unspezifisch)

Raney-Nickel

(Nickel mit großer Oberfläche; Verw.: zur Entschwefelung u. Dehalogenierung, zur Hydrierung von Doppel- u. Dreifachbindungen, zur Red. von Aldehyden u. Ketonen zu Alkoholen, von Nitrilen, Nitro-Verb. od. Oximen zu Aminen, zur Dehydrierung von prim. u. sek. Alkoholen bzw. Ketonen)

Reduktionen

(eine kurze Übersicht über die Methoden)

Substrat	Produkt	Reagenz
Aldehyd	prim. Alk.	LiAlH ₄ , NaBH ₄
Keton	sek. Alk.	LiAlH ₄ , NaBH ₄
Carbonsäure	prim. Alk.	LiAlH ₄ , B ₂ H ₆ [#]
Ester	prim. Alk.	LiAlH ₄ , DIBAL (THF, Et ₂ O) ^{##}
Ester	Aldehyd	1 DIBAL (Tol., Hex., CH ₂ Cl ₂)
Carbonsäurechlorid	Aldehyd	NaBH ₄ , LiAlH(Otert-Bu) ₃
Amid	Amin	LiAlH ₄ , DIBAL ^{###}
Nitril	Amin	LiAlH ₄ , H ₂ /NH ₃ /Pd auf C
Nitril	Aldehyd	1 DIBAL (Tol., Hex., CH ₂ Cl ₂)

#nur, wenn keine Doppel- od. Dreifachbind. vorhanden; Carbsre. chemoselektiv neben Ester reduzierbar

##bevorzugtes Reagenz für α,β -unges. Ester zu Allylalkohol

###nur manche tert. Amide sind zu Alkoholen reduzierbar, z.B. mit Superhydrid

Reaktivitäten von Hydrierkatalysatoren

Pd, Pt $C\equiv C > C=C \gg C=O$

Raney-Ni $C=C > C=O \gg COOR, CONR_2, COOH$

Rh selektive Hydrierung eines Aromaten (z.B. zu Cyclohexan) neben anderen funkt. Gr. (Ketone etc.)

reduktive Aminierung: Hydrierung in Anwesenheit von Aminen, Reduktion von Ketonen od. Aldehyden zu Aminen ($R_2C=O + HNR_2$ zu R_2C-NR_2)

Reduktionen R_{sp^3-X} zu R_{sp^3-H}

prim./sek. Alkyl-Br, -I, -sulfonate LiBHEt₃ (Superhydrid[®]), LiAlH₄

Alkyl-Cl leichter mit Superhydrid

R-Hal redukt. Dehalogen. m. n-Bu₃SnH od. (Me₃Si)₃SiH und AIBN

Epoxide (zu Alkoholen) LiAlH₄ und Superhydrid

Epoxyalkohole (zu 1,3-Diolen) NaAlH₂(OCH₂CH₂OCH₃)₂ (Red-Al[®])

(zu 1,2-Diolen) DIBAL (Di-i-Butyl-Alanat, HAl₂Bu₂)
DIBAH, DIBAL-H)

Sonstiges

Ar-NO₂ zu Ar-NH₂ mit Fe/HCl od. Zn/HCl (im Sauren)

zu Ar-N(OH)H mit Zn/NH₄Cl/H₂O (Puffer)

zu Ar-NH-NH-Ar mit Al/NaOH (im Alkalischen)

Alkine zu trans-Olefinen mit Li/NH₃(fl)

zu cis-Olefinen mit H₂/Lindlar-Kat.

Chemoselektive Reduktionen von Carbonylverb.

Redukt. der sterisch weniger gehinderten C=O-Bind. mit L-Selectride[®] (LiBH(sek-Bu)₃): Unterscheidung Aldehyd/Keton u. Keton/gehindertes Keton

Reduktion der sterisch stärker gehinderten C=O-Bind. durch Vorkomplexierung der weniger gehinderten Position mit (2,6-Di-tert-Butyl-4-methylphenyl-O-)₂-Al-Me (diese wird dadurch stark gehindert) und dann Red. der freien gehinderten Position mit iBu₂AlH

siehe auch Luche-Reduktion

Redukt. von α,β -ungesättigten Carbonylen neben gesättigten mit CeCl₃, NaBH₄, MeOH (Luche-Red.)

Red. von gesättigten Carbonylen neben ungesättigten mit NaBH₄, MeOH/CH₂Cl₂, -78°C

Diastereoselektivität der Redukt. von Carbonylverb.

Hochselektiver Angriff auf Carbonyl nur von konvexer Molekülseite

	<p>(Bicyclen) mit L-Selectride[®]</p> <p>Cram-/Cram-Chelat-/Felkin-Anh-Modell</p> <p><u>Enantioselektive Reduktion von Carbonylfunkt. zu Alkoholen (Bsp.)</u></p> <p>siehe auch Noyori-Reduktion/-Hydrierung</p> <p>Red. mit (+)- od. (-)-Alpine-Boran[®] (Ipc-(9-BBN))</p> <p>Red. mit (+)- od. (-)-Browns Chlorboran (Diisopinocampheylchlorboran, (Ipc)₂BCl)</p> <p>siehe auch CBS-Reduktion</p>
<p>Reformatsky-Reaktion</p> <p><i>(Darstellung von β-Hydroxycarbonsäureestern durch Umsetzung von Halogenessigsäureestern mit Aldehyden od. Ketonen in Ggw. von Zink in siedendem Benzol od. a. Lösungsmitteln; große Ähnlichkeit mit der Grignard-Reaktion, aber Zn-Organyle greifen keine Ester an; größere Toleranz von funkt. Gr. bei Zn-Organylen;</i></p> <p><i>allg.: alle Reaktionen, die über Metallinsertionen in durch Carbonylgruppen aktivierte Hal-C-Bind. und anschl. Umsetzung mit Elektrophilen verlaufen, werden Reformatsky-R. genannt)</i></p>	<p> $\text{R}^1\text{-CH(Br)-COOR}^2 \xrightarrow{+\text{Zn}} \text{R}^1\text{-CH(ZnBr)-COOR}^2 \xrightarrow{+\text{R}^3\text{-C(=O)-R}^4}$ </p> <p> $\text{R}^3\text{-C(O-ZnBr)-CH(R}^1\text{)-R}^4 \xrightarrow{\text{H}^+ / \text{H}_2\text{O}} \text{R}^3\text{-C(OH)-CH(R}^1\text{)-R}^4 \xrightarrow{\text{H}^+ / -\text{H}_2\text{O}} \text{R}^3\text{-C=C(R}^1\text{)-R}^4\text{-COOR}^2$ </p> <p> </p> <p> </p>
<p>Robinson-Anellierung</p> <p><i>(Anellierung von Cyclohexanonringen; im Prinzip Kombination der Michael- mit nachfolgender Aldol-Addition; Steroid-</i></p>	<p> $\text{Cyclohexanone} + \text{H}_2\text{C=CH-C(=O)-CH}_3 \xrightarrow{\text{NaOC}_2\text{H}_5} \text{Bicyclic } \alpha,\beta\text{-unsaturated ketone (with CH}_3\text{)}$ </p> <p> $\text{Bicyclic } \alpha,\beta\text{-unsaturated ketone} \xrightarrow{\text{NaOC}_2\text{H}_5 / -\text{H}_2\text{O}} \text{Bicyclic enone}$ </p>

<p>Gerüst-Synthese möglich)</p>	
<p>Rosenmund-Reduktion (Reduktion von Säurechloriden zu Aldehyden mit Pd auf BaSO₄, die Weiterred. zum Alkohol wird durch selektives Vergiften des Katalysators (mit Thiophen, Chinolin, Thioharnstoff) verhindert)</p>	$\text{RCOCl} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd-BaSO}_4} \text{RCHO} + \text{HCl}$
<p>Roush-Kupplung (asymmetrische Allylierung/Crotylierung von Aldehyden mit den Roush-Reagenzien (chirale Allyl- od. (E)-/(Z)-Crotyl-Boronsäureester (s. Bsp.); nach Hoffmann mit zusätzlichem Chiralitätszentrum am C-Atom in α-Stellung zu B und sperrigeren Cyclohexylsubst., was zu einer höheren Selektivität führt)</p>	<p style="text-align: center;">>91% (76% ee by Mosher)</p>
<p>Sakurai-Reaktion (Addition von Allylsilanen an α,β-unge-sättigte Ketone (Lewissäure kat.), Produkte sind δ,ε-unges. Carbonyle)</p>	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O}) + \text{CH}_2=\text{CH}-\text{Si}(\text{CH}_3)_3 \xrightarrow{\text{TiCl}_4} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})$
<p>Sandmeyer-Reaktion (Überführung von Diazoniumsalzen in</p>	$\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{X}^- + \text{CuX} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{X}$

<p><i>Aryl(pseudo)halogenide; i.a. werden Cu(I)X-Salze verwendet (X=Cl, Br, CN)</i></p>	
<p>Schiemann-Reaktion <i>(Fluorierung von Aromaten durch Erhitzen von Diazonium-tetrafluoroboraten; verwendet man ein Diazoniumsalz ohne Fluor und erhitzt in H₂O oder ROH, so bilden sich Phenole (Phenolverkochung) bzw. Arylether)</i></p>
<p>Schiff-Base <i>(Bez. für gut krist., beständige Kondensationsprod. aus Aldehyden od. a. Carbonyl-Verb. u. prim. Aminen; Azomethine, im Fall von R³=C₆H₅ auch Anile)</i></p>

Schmidt-Reaktion

(Umsetzung von Carbo-nylverbindungen mit Stickstoffwasserstoff-säure in in Ggw. starker Mineralsäuren zu Stick-stoff-Verb.; aus Car-bonsäuren entstehen Amine, aus Aldehyden Nitrile u. aus Ketonen Säureamide; ähnlich der Curtius- u. Beck-mann-Umlagerung; bei Aryl-alkyl-ketonen wandert im allg. der Aryl-Rest; cycl. Ketone ergeben Lactame)

Schwartz-Reagenz

(Bis(η^5 -cyclopentadienyl)hydrido-zircon-chlorid; wird in der org. Synth. zur Hydrozirconierung verwendet, da es sich leicht an die olefin. Doppelbindung anlagert; die Zr-org. Verb. lassen sich ähnlich der Hydro-borierung, Hydrosilylie-rung u. Hydroaluminie-rung durch Umsetzung mit Elektrophilen (I_2 etc.) in org. Verb. mit neuen funktionellen Gruppen spalten; syn-Addition an Mehrfach-bindungen)

Screttas-Yus-Verfahren

(Reduktive Lithiierung von Alkylchloriden)

Selenoxidpyrolyse

(Thermische Zersetzung von Alkylarylselenoxiden zu einem Olefin und einer Arylselenensäure; eine der mildesten Methoden zur Einführung von C=C-Doppelbind. durch β -Elim.; syn-Elim.)

(z.B. Dehydratisierung primärer Alkohole)

Seyferth-Gilbert-Homologisierung

(Seyferth-Verfahren)

(Transformation eines Aldehyds in ein Alkin; zuerst Horner-W.-E.-R. mit $(\text{RO})_2\text{P}(\text{O})\text{CHN}_2$ zu einer Diazoverb., dann N_2 -Abspalt. u. [1,2]-Umlagerung des entstehenden Vinylcarbens; vgl. Corey-Fuchs-R.)

Shapiro-Reaktion

(Reaktion zwischen einer Vinylolithiumverbindung (aus Tosylhydrazonen) und einem Elektrophil (Aldehyd-C, H^+ etc.); Umpolung; evtl. C-C-Knüpfung)

<p>Sharpless-Asymmetrische-Dihydroxylierung <i>(Asymmetrische Variante der cis-Dihydroxylierung mit OsO₄; zusätzlicher chiraler Ligand an OsO₄; Zweiphasensystem; Reagenzienmischungen käuflich: AD-mix-α und AD-mix-β)</i></p>	<p style="text-align: center;">(Merkschema für Selektivitäten)</p>
<p>Sharpless-Epoxidierung <i>(Asymmetrische Epoxidierung von Allylalkoholen mit tert-Butylhydroperoxid in Gegenwart von Titan(IV)-isopropylat und (+)-L- bzw. (-)-D-Diethyltartrat (DET) od. (+)/(-)-Diisopropyltartrat (DIPT); Selektivität über einfaches Schema vorher-sagbar (s. Bild))</i></p>	

Simmons-Smith-Reaktion

(Synthese von Cyclopropanen, i.a. mit CH_2I_2 und $\text{Zn}(\text{Cu})$; carbenoide Reakt., d.h. kein Auftreten freier Carbene)

(Asymmetrische Varianten:

heterogene Reakt. mit $\text{Zn}(\text{Cu})$ ersetzt durch homogene Reagenzien + chirale Reagenzien

Furukawa:
Diiodmethan und Diethylzink

Sawada: Diiodmethan und Ethylzinkiodid

Charette- Cyclopropanierung:

Diiodmethan, Diethylzink und chiraler Borsäureester (stöch.)

Skraup-Chinolinsynthese

(Chinoline durch Reaktion von in 2-Stellung unsubstituierten arom. Aminen mit Glycerin u. einem Oxid.-Mittel (z.B. Nitrobenzol, Arsenpentoxid, Fe_2O_3 , Pikrinsäure) in konz. Schwefelsäure; Anlagerung des Anilins an das aus Glycerin durch Wasserabspaltung entstandene Acrolein zu einer Dihydrochinolin-Verb., dann Dehydrierung (m. Ox.-Mittel) zum Chinolin-Deriv.)

Sonogashira-Kupplung

(C-C-Bindungskupplung zwischen einem sp - und einem sp^2 -Kohlenstoff; Aryl-, Alkenyl- od. Pyridylhalogenide reagieren (mit kat. $(\text{Ph}_3\text{P})_2\text{PdCl}_2$ und kat. CuI) mit terminalen Alkinen; ähnlich der Stephens-Castro-Kupplung, aber mildere Bed.)

(Bei Verwendung von Triflaten anstatt von Halogeniden, wird die Reaktion auch Cacchi-Kupplung genannt.)

Steglich-Base (-Katalysator)

(4-Dimethylamino-pyridin, DMAP; Verwendung zur nucleophilen Katalyse bei der Carbonsäureaktivierung)

Stephens-Castro-Kupplung

(Kupplung von Aryl-iodiden (od. Alkenyl-iodiden) und Cu(I) -acetylid in reflux. Pyridin; Vorreiterreakt. zur Sonogashira-Kupplung)

Stevens-Umlagerung

(Basenkatalysierte Umlagerung quartärer)

Ammonium-Salze mit einer aktivierten Methylen-Gruppe unter Wanderung einer Alkylgruppe zu tert. Aminen; aktivierende Reste R^1 : Acyl- u. Alkoxy-carbonyl-Rest, wanderungsfähige Gruppen R^2 z.B. Allyl-, Benzyl- od. Phenyl-Rest)

Stille-Kupplung

(Pd-katalysierte Kreuzkupplung zwischen organischen Elektrophilen (Alkenyl-, Arylhalogenide od. -triflate) und Organostannanen (Alkenyl-, Arylstannane); milde Bed. und Toleranz vieler funkt. Gruppen (COOR, CN, OH, CHO) in beiden Kupplungspartnern; in Gegenwart von CO werden die Reaktanden über eine Carbonylfkt. verbunden $RC(O)R'$)

Stobbe-Kondensation

(Der Claisen-Kondensation verwandte Synthese, die zu Alkylidenbernsteinsäureestern (Itaconsäure-Halbester) führt; Ausgangsprod. sind Aldehyde od. Ketone u. Bernsteinsäurediester)

Stork-Enamin-Reaktion

(Alkylierung von Enaminen; Acylierung auch möglich)

Strecker-Synthese

(α-Aminosäuren aus Aldehyden, Ammoniak und Cyanwasserstoff)

Eherlenmeyer modification:

Tiemann modification:

Zelinsky-Stadnikoff modification:

Knoevenagel-Bucherer modification:

Suzuki-Kupplung

(Pd-katalysierte Kreuzkupplung zwischen einer 1-Alkenylbor-Verbindung (od. Aryl od. Allylborverb.) und einem Elektrophil (Alkenyl-, Aryl- od. Allylhalogenid od. -triflat); Verwendung einer 9-BBN-Alkylverb. (o.a. Alkylborverb.) als Nucleophil mögl.; Kombination der regio-spezifischen Hydroborierung und der oxidativen Addition von C-Het-Bindungen an Pd(0); speziell nützlich zur Synthese konjugierter Diene hoher ste-

reoisomerer Reinheit)

Swern-Oxidation

(Swern-Reagenz: Dimethylsulfoxid (DMSO), Oxalylchlorid ClC(O)C(O)Cl , NEt_3 ; prim. Alkohole zu Aldehyden und sek. Alkohole zu Ketonen; DMSO-Aktivierung auch mit SO_3 , DCC, Ac_2O od. TFAA mögl.)

Takai-Reaktion

(trans-Doppelbindungen aus Aldehyden und geminalen Dihalogeniden in Gegenwart von Cr(II)-chlorid; Cr-vermittelte Wittig-Reakt.; geeignet zur Darstellung von Vinylsilanen)

Tebbe-Reagenz

(Tebbe-Grubbs-Reagentien)

(Methylierungsreagentien mit deren Hilfe Carbonyl-Verb. (wie bei Wittig-R. u. Varianten) in terminale Alkene überführt werden können; Komplexe des Titanocendichlorids mit Trimethylaluminium; besitzen für die Methylierung von ster. anspruchsvollen Ketonen od. auch Carbonsäureestern gegenüber der Wittig Reaktion beträchtliche Vorteile)

Tiffeneau-Demjanov-Umlagerung

(Ringerweiterung von β -Aminoalkoholen; Nitrosierung von 1-Aminomethyl-cycloalkanolen führt über eine Carbokationen-Zwischenstufe zur Ringerweiterung u. zur Ausbildg. einer Carbonyl-Funktion; Semipinacol-Umlagerung)

Tishchenko-Reaktion

(Tischtschenko-Claisen-Reaktion)
(Disproportionierung von Aldehyden ähnlich Cannizzaro-R.; man läßt hier aber statt Alkalien Natrium- od. Aluminiumalkoholat einwirken; es bilden sich Ester und aus Dialdehyden Lactone)

Ugi-Kondensation

(Vier-Komponenten-Reaktion)
(Aus Passerini-Reaktion weiterentwickelte Reaktion, bei der ein Isonitril, eine Carbonsäure, ein Aldehyd od. Keton u. Ammoniak bzw. ein prim. Amin miteinander reagieren u. Bisamide entstehen; Ausbau zur Peptid-synthese möglich)

Ullmann-Reaktion

(C-C-Kupplung zw. Cu-Organyl u. Arylhalogenid; Biphenyl-Synthese unter Verwendung von Cu und Arylhalogeniden; auch gekreuzte Ullmann-Reakt. mögl (Bsp.), Ar-S_N-Reaktion)

Umlagerungen

(tabellarische Übersicht über verschiedene Umlagerungen)

Typ	Beispiel	Name
1,2-Umlagerung C→C	<p style="text-align: center;"> <chem>CC1(C)C2CCC1(C)C2O >> CC1(C)C2CCC1(C)C2=O</chem> </p> <p style="text-align: center;">Isoborneol Camphen</p>	Wagner-Meerwein-Umlagerung (s.a. Pinakol-Pinakolon-Umlagerung)
	<p style="text-align: center;"> <chem>C1CCC1N >> C1CC1CO</chem> </p>	Demjanow-Umlagerung ¹
	<p style="text-align: center;"> <chem>C1CCC(C1)CN >> C1CCCCC1=O</chem> </p>	Tiffeneau-Demjanow-Umlagerung
	<p style="text-align: center;"> <chem>C1CCC(CC1)C(=O)Cl >> C1CCCC1C(=O)OR</chem> </p>	Favorskii-Umlagerung
	<p style="text-align: center;"> <chem>R-C(=O)-CHN2 >> R-C=C=O</chem> </p>	Wolff-Umlagerung
	<p style="text-align: center;"> <chem>Ar1-C=C(X)-Ar2 >> Ar1-C#C-Ar2</chem> </p>	Fritsch-Buttenberg-Wiechell-Umlagerung

Wittig-
Umlagerung

Elektro-
cyc-
lische
Umla-
gerung

elektrocyclische
Reaktionen
(s.a. con- u.
disrotatorisch)

sigmatrope
[1,5]-H-
Verschiebung

sigmatrope
[3,3]-C-
Verschiebung
(s.a. Cope-
Umlagerung
u. vgl. Claisen-
Umlagerung)

Di- π -Methan-
Umlagerung²

**Veresterung /
Aktivierung /
Makrolactonisie-
rung nach
Mukaiyama,
Yamaguchi und
Corey-Nicolau**

*(Zur Veresterung /
Lactonisierung werden
aktivierte Carbonsäuren
benötigt.)*

*(Makrolactonisierun-
gen nach: Yamaguchi,
Corey-Nicolau, Mukai-
yama; oft zusätzl. Ver-
wendung des Verdün-
nungsprinzips nach
Ziegler u. Ruggli; s.a.
Mitsunobu-Reaktion)*

Aktivierung:

Mukaiyama: mit N-Methyl-2-chlorpyridiniumiodid als Pyridiniumsalz

Yamaguchi: mit Trichlorbenzoesäurechlorid als gemischtes Anhydrid

Zugabe von Steglich-Base erhöht teilweise die Reaktivität bei den Makrolactonisierungen (nucleophile Katalyse)

Corey-Nicolau-Doppelaktivierung: mit 2,2'-Dipyridyldisulfid (nach Mukaiyama) als Thio(pyridyl)ester

weitere Methoden: mit Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) als Acylisoharnstoff

Vilsmeier-Formylierung
(Vilsmeier-Haack)

(Formylierung von aktivierten arom. Verb.; als Formylierungsreagentien dienen N,N-disubstituierte Formamide (z.B. DMF) in Ggw. von Phosphoroxidchlorid (POCl₃) od. Phosgen)

Y = Elektronen-liefernder Substituent (z.B. OR, NR₂)

Vinylcyclopropan-Umlagerung

(thermische Umlagerung von Vinylcyclopropanen zu Cyclopenten; bedeutend für die Cyclopenten-Synthese; Darstellung der Vinylcyclopropane durch 1,2-Addition eines Carbens an eine Doppelbindung eines 1,3-Diens oder über die Di- π -Methan-Umlagerung)

Wacker-Verfahren

(Pd/Cu-katalysierte Oxidation von Olefinen zu Carbonylverbindungen; techn. je nach Lösungsmittel zur Herstellung von Acetaldehyd (H₂O), Vinylacetat (Essigsäure), Vinylether (Alkohol) u. Vinylchlorid (inerte, nicht-wässr.) aus Ethen)

Wagner-Meerwein-Umlagerung

(Nucleophile Umlagerung des Kohlenstoffgerüsts über Carbokationen; tritt bes. leicht in Ggw. von Lewis-Säuren in polaren Lösungsmitteln ein; [1,2]-Umlagerung von H-Atomen od. KW-Resten in Carbokationen; Bsp. für die Reaktion z.B. die Neopentyl-Umlagerung, die Pinakol-Pinakolon- u. die Retropinakolon-Umlagerungen)

Weinreb-Amide

(Amide mit dem Strukturelem. -N(OMe)Me; sie stellen aktivierte Amide dar, die leicht mit metallorg. Reag. umgesetzt werden können; Darst. aus Carbonsäuren mit ClCO₂iBu / NEt₃ und H₂N(Me)OMe⁺Cl bzw. aus Säurechloriden mit H₂N(Me)OMe⁺Cl / Py)

Bsp.: -N(Me)OMe ist schlechte Abgangsgruppe, d.h. z.B. bei Reduktion eines Weinreb-Amids mit DIBAL kann sie aus Tetraederintermediat nicht eliminiert werden, es entsteht zunächst kein reaktiver Aldehyd und die Reaktion bleibt auf der Stufe des Tetraederintermediats stehen, erst bei der Aufarb. zerfällt Halbaminale zu Aldehyd und man kann so Carbonsäuren selektiv nur bis zum Aldehyd reduzieren

Weinreb-Reagenz
(H₃C(Cl)Al-N(Me)OMe, Reagenz zur Darstellung von Weinreb-Amiden aus Lactonen u. a. auch weniger aktivierten Carbonsäurederivaten)

Wilkinson-Katalysator
(Chlorotris(triphenylphosphin)rhodium(I); Verw. als Katalysator im homogenen Syst. für Hydrierungen, Hydroformylierungen u.a. Reaktionen; z.B. selektive Hydrierung einer zweifach subst. Doppelbind. neben einer dreifach subst. Doppelbind.)

Willgerodt-Kindler-Reaktion (S₈)
(Willgerodt-Reaktion (Polysulfid))

(Umwandlung von Ketonen, insbes. subst. Alkylarylketonen, in Säureamide von gleicher Kohlenstoff-Zahl u./od. den Ammoniumsalzen der entsprechenden Carbonsäure durch Erwärmen mit wäss. Ammoniumpolysulfid;

<p>W.-Kindler-R. analog: führt beim Erhitzen der Ketone mit prim. od. sek. Aminen u. Schwefel zu Thioamiden)</p>	
<p>Williamson-Ethersynthese (Asymmetrische Ether aus Alkoholaten und Alkylhalogeniden)</p>	$\text{RO}^-\text{Na}^+ + \text{R}'\text{X} \xrightarrow{-\text{NaX}} \text{R}-\text{O}-\text{R}'$
<p>Wittig-Horner-Reaktion (Kondensierende Olefinsynthese aus einem metallierten Diphenylalkylphosphanoxid $\text{Ph}_2\text{P}(\text{O})-\text{CHR}^-\text{M}^+$ und Aldehyden)</p>	<p>(Bsp. ähnlich Horner-Wadsworth-Emmons-Reakt.)</p>
<p>Wittig-Olefinierung (Olefine aus Phosphonium-Yliden und Carbonylverbindungen, stabiles Ylid (COOR-Rest): trans-selektiv; „salzfrei“-Variante: Ylid wird mit nicht-lithiumhaltiger Base (NaNH_2, KOtert-Bu, KHMDS) hergestellt, aus labilen Yliden (Alkyl-Rest) erhält man stereoselektiv cis-Olefine)</p>	<p>1. Dibal-H, CH_2Cl_2 -78°C (Redukt.) 2. $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHCOOMe}$ 75%</p> <p>$\text{KN}[\text{TMS}]_2$</p> <p>> 90%</p>

Wittig-Olefinierung

(Schlosser-Variante)

(trans-Olefine aus der Reaktion von nicht-stabilisierten (labilen) Yliden und Aldehyden)

Wittig-Umlagerung

(Umlagerung von Ethern zu Alkoholen (über Metallierung in α-Stellung); bei der [2,3]-sigmatropen Variante (bei Allylethern) lagert ein Allyloxy-Carbanion in ein Homoallylalkoholat um)

(2. Bsp.: SmI₂-induzierte Variante anstatt baseninduziert)

Wohl-Ziegler-Bromierung

(Bromierung in Allylposition mit N-Bromsuccinimid und kat. AIBN; man setzt Olefine od. Verb. mit aktivierten Methylen-Gruppen bei höherer Temp. mit N-Bromsuccinimid um, wobei Subst. in Allyl- bzw. α-Stellung zur aktivierenden Gruppe (Carbonyl-Gruppe, Phenyl-Rest etc.) eintritt)

Wolff-Umlagerung

(Ketene aus α -Diazo-ketonen; Reaktion, in deren Verlauf α -Diazo-carbonyl-Verbindungen (Darst. z.B. durch Diazotierung aus Amino-verb.) nach Stickstoff-Verlust eine Gerüstumlagerung erleiden; N_2 -Abspaltung bewirkt durch Katalyse von Ag, Cu, deren Ionen od. Edelmetall-Kat., durch Bestrahlen od. Erhitzen, wobei über Carbonylcarbene Ketene gebildet werden)

Wolff-Kishner-Reduktion

(Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu Kohlenwasserstoffen; Aldehyde u. Ketone werden mit Hydrazin überführt u. diese in Ggw. einer starken Base auf ca. $200^\circ C$ erhitzt, worauf unter N_2 -Abspaltung die KW gleicher C-Atomzahl entstehen)
(Bsp. ist eher Huang-M.-V.)

Wolff-Kishner-Reduktion

(Huang-Minlon-Variante)
(Isolation der Hydrazone nicht mehr erforderlich; Behandlung des Ketons mit Hydrazinhydrat mit KOH in Diethylenglykol, $200^\circ C$; Eintopfreaktion)

<p>Woodward-Hoffmann-Regeln (Regeln, die Aussagen über den Verlauf von pericyclischen Reaktionen machen)</p>	<p>Auswahlregeln für m+n Cycloadditionen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>m+n</th> <th>supra/supra</th> <th>supra/antara</th> <th>antara/antara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4n</td> <td>verboten</td> <td>erlaubt</td> <td>verboten</td> </tr> <tr> <td>4n+2</td> <td>erlaubt</td> <td>verboten</td> <td>erlaubt</td> </tr> </tbody> </table>				m+n	supra/supra	supra/antara	antara/antara	4n	verboten	erlaubt	verboten	4n+2	erlaubt	verboten	erlaubt		
	m+n	supra/supra	supra/antara	antara/antara														
4n	verboten	erlaubt	verboten															
4n+2	erlaubt	verboten	erlaubt															
<p>Regeln für electrocyclische Reaktionen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>π-Elektronen</th> <th>thermisch</th> <th>photochemisch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>disrot</td> <td>conrot</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>conrot</td> <td>disrot</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>disrot</td> <td>conrot</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>conrot</td> <td>disrot</td> </tr> </tbody> </table>				π -Elektronen	thermisch	photochemisch	2	disrot	conrot	4	conrot	disrot	6	disrot	conrot	8	conrot	disrot
π -Elektronen	thermisch	photochemisch																
2	disrot	conrot																
4	conrot	disrot																
6	disrot	conrot																
8	conrot	disrot																
<p>Wurtz-Reaktion (Kupplung von Alkylhalogeniden über Na-org. Verb., die mit weiterem R-X reagiert; Synth. von Alkanen durch Dehalogenierung von Alkylhalogeniden mit metall. Na; Herst. symm. Alkane; meist schlechte Ausbeuten; nur Synth. kleiner Cyclen durch intra-molek. Reakt. von präp. Bedeutung; auch mit anderen Metallen möglich (Zn, Fe, Cu, Li, Mg etc.))</p>	<p>$2RX + 2Na \rightarrow R-R + 2NaX$</p>																	
<p>Zimmerman-Traxler-Übergangszustands-Modell (Modell zur Beschreibung sechsgliedriger cyclischer ÜZ; findet z.B. zur Erklärung der Diastereoselektivitäten verschiedener Aldoladditionen Verwendung)</p>	<p>Zimmerman-Traxler Transition State Model in a Chromium (II)-Mediated Reformatsky Reaction</p> <p>$Y = CH_2, O$</p>																	

Übersicht über gängige Schutzgruppen

Schutzgruppe für	Abk. (Name)	Formel	Installation	Abspaltung	Bemerkung
Alkohole	Me (Methylether)	-O-Me	Williamson-R. od. Me_2SO_4 , Base od. Meerwein-Reag.	konz. HI od. TMS-I, CHCl_3 od. Lewisäure (BBr_3)	
	Bn (Benzylether)	-O- CH_2Ph	Base, Benzylbromid od. -chlorid	kat. Hydrierung mit Pd od. Hydrogenolyse mit Na, K od. Li in $\text{NH}_3(\text{l})$	
	PMB (para-Methoxybenzylether)	-O- $\text{CH}_2(\text{p-O-Me-Ph})$	$\text{NaN}(\text{SiMe}_3)_2$, PMBBBr	DDQ od. CAN	red. Öffnung eines Acetals –O-C(p-O-Me-Ph)–O-R mit DIBAL-H führt auch zu -OPMB
	t-Bu (tert-Butylether)	-O-C(CH_3) ₃	2-Methyl-2-propen, Säure (H_2SO_4 , BF_3)	TFA od. TMS-I	
	MOM (Methoxymethylether)	-O- CH_2OCH_3	$\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ und Base (NaH in THF)	50% wäßr. AcOH mit H_2SO_4 -Kat. od. HCl in MeOH	
	MEM (2-Methoxyethoxymethylether)	-O- $\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	NaH od. DIEA, Methoxyethoxy-chlormethylether	ZnBr_2 od. TiCl_4 in CH_2Cl_2	
	THP (Tetrahydropyranyl-ether)	-O-2-c- $\text{C}_5\text{H}_9\text{O}$	DHP, p-Ts-OH	wäßr. Säure	es entsteht Stereozentrum!!!
	Tr (Trityl-)	-O-CPh ₃	Tr-Cl, Et_3N , DMAP	saure Bed.	ähnliche Schutzgr.: MMT, DMT, TMT

(Mono-, Di-, Trimethoxy-Tr) sind noch säureempfindlicher

TMS (Trimethylsilylether)	-O-Si(CH ₃) ₃	Me ₃ SiCl, Et ₃ N od. Pyridin (Py)	wäßr. od. saure Bed. od. TBAF	
TES (Triethylsilylether)	-O-Si(CH ₂ CH ₃) ₃	Et ₃ SiCl od. Et ₃ SiOTf, Py	wäßr. Säure od. Fluorid (TBAF)	i.a. etwas stabiler als TMS, bes. gegenüber H ₂ O
TIPS (Trisopropylsilylether)	-O-Si(CH(CH ₃) ₂) ₃	ⁱ Pr ₃ SiCl, Imidazol od. DMAP	Fluorid (TBAF, aq. HF)	schon relativ säurestabil
TBDMS (TBS, tert-Butyldimethylsilylether)	-O-Si(CH ₃) ₂ -t-Bu	TBDMS-Cl, Imidazol od. DMAP; TBDMS-OTf, 2,6-Lutidin	Fluorid (TBAF, KF, aq. HF)	stabiler gegen Säure als obige Silylschr.
TBDPS (tert-Butyldiphenylsilylether)	-O-SiPh ₂ -t-Bu	TBDPS-Cl, Imidazol	TBAF	ähnlich TBDMS, aber insges. stabiler
Ac (Acetatester)	-O-C(O)CH ₃	Ac ₂ O od. AcCl, Pyridin od. Et ₃ N	saure od. basische Hydrolyse; LiAlH ₄	
Bz (Benzoatester)	-O-C(O)Ph	PhCOCl od. (PhCO) ₂ O, Et ₃ N od. Py	basische Hydrolyse (K ₂ CO ₃) od. LiAlH ₄	
Mes (Mesitoatester)	-O-C(O)-C ₆ H ₂ -2,4,6-trimethyl	Mes-Cl, Py od. Et ₃ N	LiAlH ₄ od. wäßr. KOt-Bu	
Piv (Pivaloatester)	-O-C(O)-t-Bu	Piv-Cl, Py	DIBAL-H	
Diol				
Acetonid (Isopropyliden-)	-O-C(Me ₂)-O-	2-Methoxy-1-	aq. HCl od. HOAc od.	

	ketal)		propen, HBr od. Aceton, Säurekat.	p-TsOH in MeOH	
	Benzylidenketal	-O-C(H)(Ph)-O-	Benzaldehyd, Säure	Säure	
	Cyclohexylidenketal	-O-Cy-O-	Cyclohexanon, Säure	Säure	
Aldehyde und Ketone	Ketale und Acetale	-O-R(-)R'-O-	Alkohole od. Diole, Säurekat.	Säure (TFA, Oxalsäure)	
	Dithioketale und Dithioacetale	-S-R(-)R'-S-	Thiol, Säurekat.	wäßr. HgCl ₂	mit Raney-Ni: reduktive Entschwefelung
Amine	Bn (Benzyl)	-N-CH ₂ Ph	Bn-Cl, K ₂ CO ₃ od. Hydroxid	H ₂ /Pd od. Na/NH ₃ (l)	
	TMS (Trimethylsilyl)	-N-SiMe ₃	TMS-Cl, Et ₃ N od. Py	wäßr. Bed.	
	Ac (Acetamid)	-N-C(O)CH ₃	Ac ₂ O od. AcCl, Py od. Et ₃ N	aq. Säure od. Meerwein-Reagenz	
	Bz (Benzamid)	-N-C(O)Ph	Bz-Cl, Py od. Et ₃ N	HCl od. HBr in AcOH od. heiße, konz. NaOH od. DIBAL-H	
	BOC (tert-Butoxycarbonyl)	-N-C(O)-OC(CH ₃) ₃	BOC-On, Et ₃ N od. BOC ₂ O	aq. HCl od. TFA	
	CBz (Z, Benzylloxycarbonyl)	-N-CO ₂ CH ₂ Ph	PhCH ₂ O ₂ CCl, Base (wäßr. Carbonat od. Et ₃ N)	H ₂ /Pd	
	FMOC (Fluorenylmeth-)	-N-CO ₂ CH ₂ -Fluorenyl	FMOC-Cl, Base	Base (Morpholin,	

oxycarbonyl)		(NaHCO ₃)	Piperidin)
NVOC	-N-CO ₂ CH ₂ (2-NO ₂ -4,5-di-OMe-Ph)	NVOC-Cl, Base	Licht

Literatur

Die folgende Liste stellt eine **Auswahl** der verwendeten Literatur dar:

- *K.P.C. Vollhardt, N.E. Shore: Organische Chemie* (Wiley-VCH)
- *R. Brückner: Reaktionsmechanismen* (Spektrum Akademischer Verlag)
- *F. Carey, R.J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry* (Plenum)
- *J. March: Advanced Organic Chemistry* (Wiley)
- *J.Fuhrhop, G. Penzlin: Organic Synthesis* (Wiley)
- *M.B. Smith: Organic Synthesis* (McGraw-Hill)
- *K.C. Nicolaou, E.J. Sørensen: Classics in Total Synthesis* (VCH)
- *G. Procter: Asymmetric Synthesis* (Oxford University Press)
- *T. Wirth: Syntheseplanung – aber wie?* (Spektrum Akademischer Verlag)
- *J.A. Gewert et al.: Problems!* (Wiley-VCH)
- *T. Laue, A. Plagens: Namen- und Schlagwortreaktionen der Organischen Chemie*
- *T. Greene, P.G.M. Wuts: Protective Groups in Organic Synthesis* (Wiley)
- *S. Warren: Organische Retrosynthese* (Teubner Verlag)